

*Standard de la  
faune européenne*



**Edition 2012**

**Standard COM/OMJ**

# Table des matières

Sommaire .....	17
Tarin des aulnes mâle ( <i>Carduelis spinus</i> ) .....	23
~ Phénotype sauvage ~ .....	23
Tarin des aulnes femelle ( <i>Carduelis spinus</i> ) .....	24
~ Phénotype sauvage ~ .....	24
Tarin des aulnes mâle ( <i>Carduelis spinus</i> ) .....	25
~ Mutation brune ~ .....	25
Tarin des aulnes femelle ( <i>Carduelis spinus</i> ) .....	26
~ Mutation brune ~ .....	26
Tarin des aulnes mâle ( <i>Carduelis spinus</i> ) .....	27
~ Mutation brune diluée ~ .....	27
Tarin des aulnes femelle ( <i>Carduelis spinus</i> ) .....	28
~ Mutation brune diluée ~ .....	28
Tarin des aulnes mâle ( <i>Carduelis spinus</i> ) .....	29
~ Mutation brune double diluée ~ .....	29
Tarin des aulnes femelle ( <i>Carduelis spinus</i> ) .....	30
~ Mutation brune double diluée ~ .....	30
Tarin des aulnes mâle ( <i>Carduelis spinus</i> ) .....	31
~ Mutation diluée ~ .....	31

Tarin des aulnes femelle ( <i>Carduelis spinus</i> ) .....	32
~ Mutation diluée ~ .....	32
Tarin des aulnes mâle ( <i>Carduelis spinus</i> ) .....	33
~ Mutation double diluée ~ .....	33
Tarin des aulnes femelle ( <i>Carduelis spinus</i> ) .....	34
~ Mutation double diluée ~ .....	34
Tarin des aulnes mâle ( <i>Carduelis spinus</i> ) .....	35
~ Mutation agate ~ .....	35
Tarin des aulnes femelle ( <i>Carduelis spinus</i> ) .....	36
~ Mutation agate ~ .....	36
Tarin des aulnes mâle ( <i>Carduelis spinus</i> ) .....	37
~ Mutation agate dilué ~ .....	37
Tarin des aulnes femelle ( <i>Carduelis spinus</i> ) .....	38
~ Mutation agate dilué ~ .....	38
Tarin des aulnes mâle ( <i>Carduelis spinus</i> ) .....	39
~ Mutation isabelle ~ .....	39
Tarin des aulnes femelle ( <i>Carduelis spinus</i> ) .....	40
~ Mutation isabelle ~ .....	40
Tarin des aulnes mâle ( <i>Carduelis spinus</i> ) .....	41
~ Mutation isabelle dilué ~ .....	41
Tarin des aulnes femelle ( <i>Carduelis spinus</i> ) .....	42
~ Mutation isabelle dilué ~ .....	42

Tarin des aulnes mâle ( <i>Carduelis spinus</i> ).....	43
~ Mutation ivoire ~ .....	43
Tarin des aulnes femelle ( <i>Carduelis spinus</i> ).....	44
~ Mutation ivoire ~ .....	44
Tarin des aulnes mâle ( <i>Carduelis spinus</i> ).....	45
~ Mutation agate ivoire ~ .....	45
Tarin des aulnes femelle ( <i>Carduelis spinus</i> ).....	46
~ Mutation agate ivoire ~ .....	46
Sizerin cabaret ( <i>Carduelis flammea cabaret</i> ) .....	48
~ Phénotype sauvage ~ .....	48
Sizerin flammé ( <i>Carduelis flammea flammea</i> ) .....	49
~ Phénotype sauvage ~ .....	49
Sizerin .....	50
Mutation brune .....	50
Sizerin .....	51
~ Mutation Pastel (ex-agate) ~ .....	51
Sizerin .....	52
~ Mutation brun pastel (ex-isabelle) ~ .....	52
Sizerin .....	53
~ Mutation écaillée (ex- pastel).....	53
Sizerin .....	54
~ Mutation brun écaillé (ex-brun pastel)~ .....	54

Sizerin .....	55
~ Mutation facteur foncé ~ .....	55
Sizerin .....	56
~ Mutation pastel facteur foncé (ex-agate foncé)~ .....	56
Sizerin .....	57
~ Mutation brun facteur foncé ~ .....	57
Sizerin .....	58
~ Mutation phaéo ~ .....	58
Sizerin blanchâtre (Carduelis hornemanni).....	59
~ Phénotype sauvage ~ .....	59
Chardonneret élégant (Carduelis carduelis).....	65
~ Phénotype sauvage ~ .....	65
Chardonneret élégant .....	66
~ Mutation brun ~ .....	66
Chardonneret élégant .....	67
~ Mutation agate ~ .....	67
Chardonneret élégant .....	68
~ Mutation pastel ~ .....	68
Chardonneret élégant .....	69
~ Mutation isabelle ~ .....	69
Chardonneret élégant .....	70
~ Mutation satiné ~ .....	70

Chardonneret élégant .....	71
~ Mutation blanc avec masque orange ~ .....	71
Chardonneret élégant .....	72
~ Mutation tête blanche ~ .....	72
Chardonneret élégant .....	73
~ Mutation jaune ~ .....	73
Chardonneret élégant .....	74
~ Mutation aminet ~ (antérieurement dénommé à tort Eumo) .....	74
Verdier d'Europe mâle (Carduelis chloris chloris) .....	78
~ Phénotype sauvage ~ .....	78
Verdier d'Europe femelle (Carduelis chloris chloris) .....	79
~ Phénotype sauvage ~ .....	79
Verdier d'Europe mâle .....	80
~ Mutation isabelle ~ .....	80
Verdier d'Europe femelle .....	81
~ Mutation isabelle ~ .....	81
Verdier d'Europe mâle .....	82
~ Mutation agate ~ .....	82
Verdier d'Europe femelle .....	83
~ Mutation agate ~ .....	83
Verdier d'Europe mâle .....	84
~ Mutation brun ~ .....	84

Verdier d'Europe femelle .....	85
~ Mutation brun ~ .....	85
Verdier d'Europe mâle .....	86
~ Mutation satiné ~ .....	86
Verdier d'Europe femelle .....	87
~ Mutation satiné ~ .....	87
Verdier d'Europe mâle .....	88
~ Mutation lutino ~ .....	88
Verdier d'Europe femelle .....	89
~ Mutation lutino ~ .....	89
Verdier d'Europe.....	90
~ Mutation pastel ~ .....	90
Verdier d'Europe mâle .....	91
~ Mutation agate pastel (dénomination provisoire en étude)~.....	91
Verdier d'Europe femelle .....	92
~ Mutation agate pastel (dénomination provisoire en étude) ~ .....	92
Verdier d'Europe.....	93
~ Mutation isabelle pastel (dénomination provisoire en étude) ~ .....	93
Verdier d'Europe.....	94
~ Mutation brun pastel (dénomination provisoire en étude) ~ .....	94
Linotte mélodieuse mâle (Carduelis cannabina).....	96
~ Phénotype sauvage ~ .....	96

Linotte mélodieuse femelle ( <i>Carduelis cannabina</i> ) .....	97
~ Phénotype sauvage ~ .....	97
Linotte à bec jaune ( <i>Carduelis flavirostris</i> ).....	99
~ Phénotype sauvage ~ .....	99
Bouvreuil pivoine ( <i>Pyrrhula pyrrhula</i> ) .....	105
~ Phénotype sauvage ~ .....	105
Bouvreuil pivoine.....	106
~ Mutation pastel ~ .....	106
Bouvreuil pivoine mâle .....	107
Mutation brun ~.....	107
Bouvreuil pivoine femelle .....	108
~ Mutation brun ~ .....	108
Bouvreuil pivoine mâle .....	109
~ Mutation brun pastel ~.....	109
Bouvreuil pivoine femelle .....	110
~ Mutation brun pastel ~.....	110
Bouvreuil pivoine.....	111
~ Mutation blanc ~ .....	111
Bouvreuil pivoine.....	112
~ Mutation jaune ~.....	112
Bouvreuil pivoine.....	113
~ Mutation brun pastel jaune ~ .....	113

Bouvreuil pivoine mâle .....	114
~ Mutation topaze ~ .....	114
Bouvreuil pivoine femelle .....	115
~ Mutation topaze ~ .....	115
Pinson des arbres mâle (Fringilla coelebs) .....	118
~ Phénotype sauvage ~ .....	118
Pinson des arbres femelle (Fringilla coelebs) .....	119
~ Phénotype sauvage ~ .....	119
Pinson des arbres mâle .....	120
~ Mutation brun ~ .....	120
Pinson des arbres femelle .....	121
~ Mutation brun ~ .....	121
Pinson des arbres mâle .....	122
~ Mutation agate ~ .....	122
Pinson des arbres femelle .....	123
~ Mutation agate ~ .....	123
Pinson des arbres mâle .....	124
~ Mutation opale ~ .....	124
Pinson des arbres femelle .....	125
~ Mutation opale ~ .....	125
Pinson des arbres .....	126
~ Mutation brun opale ~ .....	126

Pinson du nord mâle ( <i>Fringilla montifringilla</i> ) .....	128
~ Phénotype sauvage ~ .....	128
Pinson du nord femelle ( <i>Fringilla montifringilla</i> ) .....	129
~ Phénotype sauvage ~ .....	129
Serin cini mâle ( <i>Serinus serinus</i> ).....	132
~ Phénotype sauvage ~ .....	132
Serin cini femelle ( <i>Serinus serinus</i> ).....	133
~ Phénotype sauvage ~ .....	133
Venturon montanard mâle ( <i>Serinus cintrinella</i> ) .....	135
~ Phénotype sauvage ~ .....	135
Venturon montagnard femelle ( <i>Serinus cintrinella</i> ) .....	136
~ Phénotype sauvage ~ .....	136
Venturon montagnard corse ( <i>Serinus cintrinella corsica</i> ) .....	137
~ Phénotype sauvage ~ .....	137
Bec croisé des sapins mâle ( <i>Loxia curvirostra</i> ).....	140
~ Phénotype sauvage ~ .....	140
Bec croisé des sapins femelle ( <i>Loxia curvirostra</i> ).....	141
~ Phénotype sauvage ~ .....	141
Bec croisé bifascié mâle ( <i>Loxia leucoptera</i> ) .....	143
~ Phénotype sauvage ~ .....	143
Bec croisé bifascié femelle ( <i>Loxia leucoptera</i> ) .....	144
~ Phénotype sauvage ~ .....	144

Bec croisé perroquet mâle ( <i>Loxia pytyopsittacus</i> ) .....	146
~ Phénotype sauvage ~ .....	146
Bec croisé perroquet femelle ( <i>Loxia pytyopsittacus</i> ) .....	147
~ Phénotype sauvage ~ .....	147
Durbec des sapins mâle ( <i>Pinicola enucleator</i> ) .....	151
~ Phénotype sauvage ~ .....	151
Durbec des sapins femelle ( <i>Pinicola enucleator</i> ) .....	152
~ Phénotype sauvage ~ .....	152
Gros bec casse-noyaux mâle ( <i>Coccothraustes coccothraustes</i> ) .....	155
~ Phénotype sauvage ~ .....	155
Gros bec casse-noyaux femelle ( <i>Coccothraustes coccothraustes</i> ) .....	156
~ Phénotype sauvage ~ .....	156
Roselin gihagine ( <i>Rhodopechys githaginea</i> ) .....	159
~ Phénotype sauvage ~ .....	159
Moineau domestique mâle ( <i>Passer domesticus</i> ) .....	162
~ Phénotype sauvage ~ .....	162
Moineau domestique femelle ( <i>Passer domesticus</i> ) .....	163
~ Phénotype sauvage ~ .....	163
Moineau domestique mâle .....	164
~ Mutation brun ~ .....	164
Moineau domestique femelle .....	165
~ Mutation brun ~ .....	165

Moineau domestique mâle .....	166
~ Mutation « phaéo»~ .....	166
Moineau domestique femelle .....	167
~ Mutation « phaéo»~ .....	167
Moineau domestique mâle .....	168
~ Mutation agate ~ .....	168
Moineau domestique femelle .....	169
~ Mutation agate ~ .....	169
Moineau domestique mâle .....	170
~ Mutation opale ~ .....	170
Moineau domestique femelle .....	171
~ Mutation opale ~ .....	171
Moineau domestique mâle .....	172
~ Mutation brun pastel ~ .....	172
Moineau domestique femelle .....	173
~ Mutation brun pastel ~ .....	173
Moineau domestique .....	174
~ Mutation ino (ex-albino)~ .....	174
Moineau domestique .....	175
~ Mutation blanc ~ .....	175
Moineau domestique .....	176
~ Mutation mâle satiné ~ .....	176

Moineau domestique.....	177
~ Mutation femelle satiné ~ .....	177
Moineau friquet ( <i>Passer montanus</i> ).....	178
~ Phénotype sauvage ~ .....	178
Moineau friquet.....	179
~ Mutation opale ~.....	179
Moineau friquet.....	180
~ Mutation brun ~ .....	180
Moineau friquet.....	181
~ Mutation brun opale ~ .....	181
Moineau espagnol .....	182
~ <i>Passer hispaniolensis</i> ~ .....	182
Moineau soulcie.....	184
~ <i>Petronia petronia</i> ~ .....	184
Niverolle .....	186
~ <i>Montifringilla nivalis</i> ~.....	186
Jaseur boréal ( <i>Bombycilla garrulus</i> ).....	190
~ Phénotype sauvage ~ .....	190
Merle noir mâle ( <i>Turdus merula</i> ) .....	193
~ Phénotype sauvage ~ .....	193
Merle noir femelle ( <i>Turdus merula</i> ) .....	194
~ Phénotype sauvage ~ .....	194

Merle noir mâle .....	195
~ Mutation pastel ~ .....	195
Merle noir femelle .....	196
~ Mutation pastel ~ .....	196
Merle noir .....	197
~ Mutation ino (ex-albino)~ .....	197
Merle noir .....	198
~ Mutation blanc ~ .....	198
Grive musicienne (Turdus philomelos) .....	199
~ Phénotype sauvage ~ .....	199
Grive musicienne .....	200
~ Mutation brun ~ .....	200
Grive musicienne .....	201
~ Mutation blanche ~ .....	201
Grive musicienne .....	202
~ Mutation satiné .....	202
Grive draine .....	203
~ Turdus viscivorus ~ .....	203
Grive mauvis .....	205
~ Turdus iliacus ~ .....	205
Grive litorne .....	207
~ Turdus pilaris~ .....	207

Etourneau sansonnet ( <i>Sturnus vulgaris</i> ).....	210
~ Phénotype sauvage ~ .....	210
Etourneau sansonnet .....	211
~ Mutation brun ~ .....	211
Etourneau sansonnet .....	212
~ Mutation agate ~ .....	212
Etourneau sansonnet .....	213
~ Mutation phaèò ~ .....	213
Etourneau sansonnet .....	214
~ Mutation blanc ~ .....	214
Etourneau sansonnet .....	215
~ Mutation pastel ~ .....	215
Geai des chênes ( <i>Garrulus glandarius</i> ).....	218
~ Phénotype sauvage ~ .....	218
Geai des chênes .....	219
~ Mutation opale ~ .....	219
Pie bavarde ( <i>Pica pica</i> ) .....	221
~ Phénotype sauvage ~ .....	221
Pie bavarde ( <i>Pica pica</i> ) .....	222
~ Mutation brune ~ .....	222
Choucas des tours ( <i>Corvus monedula</i> ) .....	224
~ Phénotype sauvage ~ .....	224

Corneille noire (Corvus corone corone ) .....	225
~Phénotype sauvage ~ .....	225
Corbeau freux (Corvus frugilegus) .....	226
~Phénotype sauvage ~ .....	226
Corneille mantelée (Corvus corone cornix).....	227
~ Phénotype sauvage ~ .....	227
Grand corbeau (Corvus corax).....	228
~ Phénotype sauvage ~ .....	228
Mutations de la faune européenne homologuées par la COM/OMJ.....	231

# Sommaire

<u>Fringillidés</u>	<u>20</u>		
➤ <i>Genre Carduelis</i>	21		
➤ Tarin des aulnes et ses mutations	22		
➤ Sizerin	47		
➤ Sizerin cabaret	48		
➤ Sizerin flammé et ses mutations	49		
➤ Sizerin blanchâtre	59		
➤ Chardonneret élégant et ses mutations	60		
➤ Verdie d'Europe et ses mutations	76		
➤ Linotte mélodieuse	95		
➤ Linotte à bec jaune	98		
➤ <i>Genre Pyrrhula</i>	100		
➤ Bouvreuil pivoine et ses mutations	100		
➤ <i>Genre Fringilla</i>	116		
➤ Pinson des arbres et ses mutations	117		
➤ Pinson du Nord et ses mutations	127		
➤ <i>Genre Serinus</i>	130		
➤ Serin cini	131		
		➤ Venturon montagnard	134
		➤ Venturon Corse	137
		➤ <i>Genre Loxia</i>	138
		➤ Bec croisé des sapins	139
		➤ Bec croisé bifascié	142
		➤ Bec croisé perroquet	145
		➤ <i>Genre Pinicola</i>	148
		➤ Dur-bec des sapins	149
		➤ <i>Genre Coccythraustes</i>	153
		➤ Gros bec casse noyaux	154
		➤ <i>Genre Rhodopechys</i>	157
		➤ Roselin githagine	158
		<u>Passéridés</u>	<u>160</u>
		➤ <i>Genre Passer</i>	161
		➤ Moineau domestique et ses mutations	162
		➤ Moineau friquet et ses mutations	178

➤ Moineau espagnol	182
➤ <i>Genre Petronia</i>	183
➤ Moineau soulcie	184
➤ <i>Genre Montifringilla</i>	185
➤ Niverolle	186
<u>Bombycillidés</u>	<u>188</u>
➤ <i>Genre Bombycilla</i>	189
➤ Jaseur boréal	190
<u>Turdidés</u>	<u>191</u>
➤ <i>Genre Turdus</i>	192
➤ Merle noir et ses mutations	193
➤ Grive musicienne et ses mutations	199
➤ Grive draine	203
➤ Grive mauvis	205
➤ Grive litorne	207
<u>Sturnidés</u>	<u>208</u>
➤ <i>Genre Sturnus</i>	209
➤ Etourneau sansonnet et ses mutations	210

<u>Corvidés</u>	<u>216</u>
➤ <i>Genre Garrulus</i>	217
➤ Geai des chênes et ses mutations	218
➤ <i>Genre Pica</i>	220
➤ Pie bavarde	221
➤ <i>Genre Corvus</i>	223
➤ Choucas des tours	224
➤ Corneille noire	225
➤ Corbeau freux	226
➤ Corneille mantelée	227
➤ Grand corbeau	228
<u>Topographie d'un oiseau</u>	<u>229</u>
<u>Formes et tailles</u>	<u>230</u>
<u>Génétique des mutations</u>	<u>231</u>

## **Ont participé à l'élaboration de ce standard :**

**Jacques Faivre, François Vuillaume, Enrique Gomez, Lionel Durochat.**

**Documentations : UOF, FOI, FOA, KBOF**

**Photographies : P. Rocher, E. Gomez, S. Chartier, R. Driesmans, J.-M. Eytorff, B. Comelieu, A Cupido, Cazadilla, L. Durochat, R. Rojas, A. Van Mingeroet**

**Merci aux auteurs de nous avoir permis la publication de leurs photos**

**Un merci tout particulier à Hermann Heinzl pour ses illustrations**

**Terminé le 23 juillet 2012**

**La reproduction et l'utilisation de ces documents sont interdites sans l'autorisation de leurs auteurs ainsi que de la COM/OMJ.**

# Fringillidés

# *Genre Carduelis*



# Tarin des aulnes

(*Carduelis spinus*)



***Tarin des aulnes mâle (Carduelis spinus)***  
**~ Phénotype sauvage ~**

**Taille du corps** : 11 cm

Zones du plumage	Couleur
Front, vertex, occiput, calotte	Noirs avec la calotte légèrement pointillé de gris.
Joues, région auriculaire	Jaune grisâtre légèrement voilé.
Traits sourciliers	Jaunâtres partant de derrière l'œil et s'élargissant vers le cou.
Cou, nuque, scapulaires, dos	Verdâtres avec de fines stries foncées.
Poitrine, gorge	Vert jaunâtre. Certains mâles ont une petite bavette (nullement obligatoire) noire sur le haut de la gorge, elle doit être petite et régulière.
Flancs	Gris verdâtre avec des stries noirâtres qui doivent être bien régulières de chaque côté du corps.
Ventre, région anale	Légèrement grisâtre.
Ailes	Grandes rémiges noir brunâtre avec le vexille externe jaune. Rémiges secondaires liserées de grisâtre à leur extrémité. Barre alaire jaune et petit miroir jaune.
Croupion	Jaune verdâtre.
Queue	Deux premiers tiers jaunes et extrémité noire. Rectrices médianes noires.
Bec	Fin, pointu, de couleur corne claire, flammé de noir.
Yeux	Brun foncé.
Pattes, doigts	Chair foncé.
Ongles	Noirs.



Photo Rocher Philippe

**Remarque** : les jeunes oiseaux peuvent montrer de légères lunettes.

**Standard COM/OMJ**

***Tarin des aulnes femelle (Carduelis spinus)***  
**~ Phénotype sauvage ~**

**Taille du corps** : 11 cm

Zones du plumage	Couleur
Front, vertex, occiput	Grisâtres avec de fines stries entrecoupées.
Joues, région auriculaire	Brunâtres voilés jaune.
Traits sourciliers	Beaucoup moins jaunes que chez le mâle mais plutôt de couleur brun grisâtre.
Cou, épaules, dos	Grisâtres finement striés de brun noirâtre.
Poitrine, gorge, flancs	Grisâtres dans l'ensemble. Les côtés de la poitrine et surtout les flancs ont un beau dessin strié, bien régulier, net, de couleur gris foncé.
Ventre, région anale	Grisâtres.
Ailes	Gris foncé avec les mêmes marques que le mâle.
Croupion	Jaune verdâtre, légèrement strié de gris foncé.
Queue	Deux premiers tiers jaune, le reste est noir-gris. Rectrices médianes noir-gris.
Sous-caudales	Présence d'un dessin écaillé.
Bec	Fin, pointu, de couleur corne claire, flammé de noir.
Yeux	Brun foncé.
Pattes, doigts	Chair foncé.
Ongles	Noirs.



**Dimorphisme sexuel** : les femelles doivent avoir une couleur de fond la plus grise possible.

***Tarin des aulnes mâle (Carduelis spinus)***  
**~ Mutation brune ~**

Taille du corps : 11 cm

Zones du plumage	Couleur
Front, occiput, vertex	Brun très foncé. La calotte est nuancée et pointillée de beige.
Joues	Jaune verdâtre lavées de brun.
Traits sourciliers	Jaunes.
Gorge	Bavette brun foncé si elle est présente.
Poitrine	Verdâtre lavée de beige.
Croupion	Jaune verdâtre.
Queue	Deux premiers tiers jaunes et extrémité brun très foncé. Rectrices médianes brunes, très foncées.
Ailes	Grandes rémiges brun foncé avec un léger liseré jaune le long du vexille externe. Epaulés jaune verdâtre lorsqu'elles sont visibles.
Flancs	Couleur de fond blanc jaunâtre avec stries brun foncé.
Dos	Manteau couleur verdâtre strié de brun avec un voile brun clair sur le dos.
Bec	Couleur corne à la base avec l'extrémité de la mandibule supérieure brun noir.
Yeux	Brun foncé.
Pattes, doigts	Bruns.
Ongles	Foncés.

Photo Philippe ROCHER



***Tarin des aulnes femelle (Carduelis spinus)***  
**~ Mutation brune ~**

**Taille du corps** : 11 cm

Zones du plumage	Couleur
Front, occiput, vertex	Brun verdâtre striés de brun foncé.
Joues	Grisâtres lavées de brun.
Traits sourciliers	Jaunâtres.
Croupion	Jaune verdâtre légèrement strié de brun.
Queue	Premier tiers jaune et deux derniers tiers brun foncé. Rectrices médianes brunes, très foncées.
Ailes	Grandes rémiges brun foncé avec un léger liseré jaune le long du vexille externe. Rémiges secondaires au liseré jaunâtre avec barre alaire chamois et miroir jaune pâle.
Epaules	Jaune verdâtre lorsqu'elles sont visibles.
Poitrine	Blanc sale striée de brun.
Flancs	Couleur de fond beige avec stries brun foncé.
Dos	Manteau verdâtre lavé de brun assez foncé strié de brun foncé.
Bec	Couleur corne à la base avec l'extrémité de la mandibule supérieure brun noir.
Yeux	Brun foncé.
Pattes, doigts	Bruns.
Ongles	Foncés.



***Tarin des aulnes mâle (Carduelis spinus)***  
**~ Mutation brune diluée ~**

Taille du corps : 11 cm

Zones du plumage	Couleur
Front, vertex, occiput	Bruns, lavés de vert. Vertex écaillé de beige.
Trait oculaire	Jaune.
Joues	Jaunâtres, lavées de brun.
Dos	Vert brunâtre strié de brun foncé.
Gorge, poitrine	Jaune clair avec un léger voile beige. Bavette brun foncé. Poitrine plus claire.
Flancs	Jaunâtres lavés de beige à l'avant et grisâtre lavé de beige à l'arrière. Stries brunes.
Ailes	Rémiges diluées en gris brun avec bord du vexille externe jaune brunâtre. Couvertures terminées par du jaune verdâtre, bordées de brun clair, d'où une bande alaire jaune verdâtre bordée de brun clair.
Croupion	Jaune verdâtre strié de brun foncé
Queue	Deux premiers tiers jaunâtres et extrémité gris brun. Rectrices médianes gris brun, très foncées. Sous-caudales jaune verdâtre striées de brun foncé.
Bec	Brunâtre, flammé de brun foncé à la mandibule supérieure.
Pattes, doigts	Chair.
Ongles, yeux	Brun foncé.

Photo UOF



***Tarin des aulnes femelle (Carduelis spinus)***  
**~ Mutation brune diluée ~**

Taille du corps : 11 cm

Zones du plumage	Couleur
Front, vertex, occiput	Bruns striés de brun foncé.
Trait oculaire	Jaune clair.
Joues	Jaunâtres lavées de brun foncé.
Poitrine, gorge	Gris clair légèrement striée de brun
Flancs	Gris clair lavé de beige. Stries brun foncé.
Croupion	Jaune verdâtre strié de brun foncé.
Dos	Brun verdâtre strié de brun foncé.
Ailes	Rémiges diluées en gris brun avec bord du vexille externe jaune brunâtre. Couvertures terminées par du jaunâtre, bordées de brun clair, d'où une bande alaire jaunâtre bordée de brun clair.
Queue	Premier tiers jaunâtre et deux derniers tiers bruns. Rectrices médianes brun gris. Sous-caudales gris beige striées de brun.
Bec	Brunâtre flammé de brun foncé à la mandibule supérieure.
Yeux	Brun foncé.
Pattes, doigts	Chair.
Ongles	Brun foncé.



***Tarin des aulnes mâle (Carduelis spinus)***  
**~ Mutation brune double diluée ~**

Taille du corps : 11 cm

Zones du plumage	Couleur
Vertex, occiput, dos	Brun beige. Manteau sans stries.
Traits sourciliers	Jaunes.
Joues	Brunes striées de blanc.
Gorge, poitrine, flancs	Jaunâtre légèrement striée de brun beige. Bavette pratiquement devenue invisible.
Ventre	Blanc sale.
Couvertures	Petites brun beige ; Moyennes et grandes jaune pâle bordées de jaune foncé.
Rémiges	Secondaires gris très clair avec vexille externe jaune et portant une bande alaire jaune intense. Primaires gris très clair avec vexille externe jaune. Pas de miroir visible.
Croupion	Jaune strié de brun.
Queue	Deux premiers tiers jaunes et extrémité gris très clair avec vexille externe jaune. Rectrices médianes gris très clair.
Bec	Chair flammé à l'extrémité de la mandibule supérieure.
Yeux	Brun foncé.
Pattes, doigts	Chair.
Ongles	Corne claire.



***Tarin des aulnes femelle (Carduelis spinus)***  
**~ Mutation brune double diluée ~**

Taille du corps : 11 cm

Zones du plumage	Couleur
Vertex et occiput, manteau	Brun beige avec un dessin strié léger. Manteau sans stries.
Traits oculaires	Jaune clair.
Joues	Brunes, striées de blanc.
Gorge, poitrine	Gris très clair. Poitrine striée de brun beige.
Flancs	Beiges, striés de brun.
Croupion	Jaune strié de brun.
Ventre	Blanc sale.
Queue	Premier tiers jaunâtre et deux derniers tiers beiges avec vexille externe jaunâtre. Rectrices médianes beiges.
Couvertures	Petites brun beige ; Moyennes et grandes jaunâtres bordée de jaune foncé.
Rémiges	Secondaires beige avec vexille externe jaune pâle et portant une bande alaire jaune. Primaires beiges avec vexille externe jaune pâle. Pas de miroir visible.
Bec	Chair flammé à l'extrémité de la mandibule supérieure.
Yeux	Brun foncé.
Pattes, doigts	Chair.
Ongles	Corne claire.





Photo Philippe ROCHER

***Tarin des aulnes mâle (Carduelis spinus)***  
**~ Mutation diluée ~**

Taille du corps : 11 cm


Zones du plumage	Couleur
Vertex, occiput, dos	Gris très foncé lavé de vert.
Traits sourciliers	Jaunes.
Joues	Verdâtres lavées de gris.
Dos	Vert strié de gris foncé.
Poitrine, gorge	Vert jaunâtre lavée de gris clair. Bavette gris foncé si elle existe.
Flancs	Gris clair à l'arrière et gris clair lavé de verdâtre à l'avant. Stries gris foncé.
Ventre	Blanc sale.
Couvertures	Se terminent par du vert clair très lumineux qui donne une bande alaire verte avec des épaules vertes. Miroir jaune pâle.
Rémiges, rectrices médianes	Gris verdâtre. Rémiges avec bord du vexille externe jaunâtre.
Croupion, sous-caudales	Jaune verdâtre légèrement strié de gris.
Queue	Deux premiers tiers jaunes et extrémité gris verdâtre.
Bec	Brunâtre flammé de noir à l'extrémité de la mandibule supérieure.
Yeux	Brun foncé.
Pattes, doigts	Chair foncée.
Ongles	foncés.



***Tarin des aulnes femelle (Carduelis spinus)***  
**~ Mutation diluée ~**

Taille du corps : 11 cm

Zones du plumage	Couleur
Vertex, front, occiput	Gris striés de gris foncé.
Traits oculaires	Jaunâtres.
Joues	Gris brun, légèrement striées.
Gorge	Gris très clair légèrement striée de gris.
Poitrine	Gris très clair striée de gris foncé.
Dos	Gris brun, lavé de vert et strié de gris foncé.
Flancs	Gris clair striés de gris foncé avec un voile brun léger.
Croupion	Jaune verdâtre strié de gris.
Queue	Premier tiers jaunâtre et deux derniers tiers gris verdâtre. Rectrices médianes entièrement gris verdâtre. Sous-caudales gris clair striées de gris.
Ailes	Rémiges gris verdâtre avec le bord du vexille externe jaunâtre. Couvertures primaires et secondaires terminées par un bord vert lavé de chamois avec miroir jaune très pâle.
Bec	Brunâtre.
Yeux	Brun foncé.
Pattes, doigts	Chair foncé.
Ongles	Foncés.



***Tarin des aulnes mâle (Carduelis spinus)***  
**~ Mutation double diluée ~**

**Taille du corps** : 11 cm

Zones du plumage	Couleur
Vertex, occiput	Gris brun clair. Vertex avec un léger dessin.
Traits oculaires	Jaunes.
Joues	Gris verdâtre striées de clair.
Gorge	Jaunâtre légèrement striée de brun. Bavette pratiquement invisible.
Poitrine, flancs	Jaunâtre légèrement striée de gris brunâtre.
Ventre	Blanc sale.
Dos	Manteau gris brun jusqu'aux épaules, sans stries.
Croupion	Jaune strié de gris brun.
Queue	Deux premiers tiers jaunes et extrémité gris clair avec vexille externe jaune. Rectrices médianes gris clair.
Couvertures alaires	Petites : gris brun. Grandes : jaune pâle bordées de jaune intense.
Rémiges	Secondaires : gris clair avec vexille jaune et portant une bande alaire jaune intense. Primaires : gris clair avec vexille externe jaune. Pas de miroir.
Bec	Chair, flammé à l'extrémité de la mandibule supérieure.
Yeux	Brun foncé.
Pattes, doigts	Chair.
Ongles	Couleur corne.



***Tarin des aulnes femelle (Carduelis spinus)***  
**~ Mutation double diluée ~**

Taille du corps : 11 cm

Zones du plumage	Couleur
Vertex, occiput	Gris brun clair avec un dessin strié très léger.
Traits oculaires	Jaune clair.
Joues	Gris brun clair, striées de clair.
Gorge, poitrine	Gris clair. Poitrine légèrement striée de gris brun.
Dos	Manteau gris brun jusqu'aux épaules, sans stries.
Flancs	Brun clair, striés de gris brun.
Croupion	Jaune, strié de gris brun.
Queue	Premier tiers jaune et deux derniers tiers gris clair avec vexille externe jaunâtre. Rectrices médianes entièrement gris clair.
Couvertures alaires	Petites : gris brun. Moyenne : gris verdâtre bordées de jaune intense. Grandes : gris verdâtre bordées de jaune intense.
Rémiges	Secondaires : gris clair avec vexille jaune pâle et portant une bande alaire jaune. Primaires : gris clair avec vexille externe jaune pâle. Pas de miroir.
Bec	Chair flammé à l'extrémité de la mandibule supérieure.
Yeux	Brun foncé.
Pattes, doigts	Chair.
Ongles	Couleur corne.

Photo Philippe ROCHER



***Tarin des aulnes mâle (Carduelis spinus)***  
**~ Mutation agate ~**

**Taille du corps** : 11 cm

Zones du plumage	Couleur
Vertex, occiput, front	Gris foncé. Nuance de couleur dans la calotte pointillée de gris.
Traits sourciliers	Jaunes.
Joues, régions auriculaires	Vertes lavées de gris.
Gorge	Bavette gris foncé si elle est présente.
Poitrine, flancs	Vert jaunâtre. Flancs striés de gris très foncé.
Dos	Manteau verdâtre voilé de gris avec des stries noires.
Croupion	Verdâtre.
Queue	Deux premiers tiers jaunes et extrémité gris très foncé. Rectrices médianes entièrement gris foncé.
Rémiges	Grandes : gris foncé avec bords externes liserés de jaune. Secondaires avec liseré grisâtre. Barre alaire et miroir jaune clair.
Bec	Couleur chair flammé.
Yeux	Noirs.
Pattes, doigts	Chair foncée.
Ongles	Foncés.



***Tarin des aulnes femelle (Carduelis spinus)***  
**~ Mutation agate ~**

**Taille du corps** : 11 cm

Zones du plumage	Couleur
Vertex, occiput, front	Gris clair striés de noir.
Traits sourciliers	Gris clair.
Joues, régions auriculaires	Grisâtres.
Poitrine	Gris clair striée de noir dilué.
Dos	Manteau grisâtre de noir dilué.
Flancs	Gris clair avec des tries d'un gris très foncé.
Croupion	Grisâtre légèrement strié de gris foncé.
Queue	Premier tiers jaune et deux derniers tiers gris très foncé. Rectrices médianes entièrement gris très foncé.
Rémiges	Grandes : gris foncé avec bords externes liserés de jaune. Le liseré des rémiges secondaires est grisâtre. Barre alaire et miroir jaune clair.
Bec	Couleur chair flammé.
Yeux	Noirs.
Pattes, doigts	Chair foncée.
Ongles	Foncés.



Photo KBOF

***Tarin des aulnes mâle (Carduelis spinus)***  
**~ Mutation agate dilué ~**

**Taille du corps** : 11 cm

Hérédité : agate : récessif lié au sexe - dilué : dominant autosomal

Zones du plumage	Couleur
Calotte	Gris foncé.
Traits sourciliers, croupion	Jaunes.
Joues	Jaune verdâtre bien dessinées de gris foncé. Légère décoloration autour du bec.
Gorge	Bavette gris foncé si elle est présente.
Poitrine	Jaune verdâtre voilé de gris
Flancs	Jaunâtres, plus clairs que la poitrine, avec stries gris foncé.
Dos	Vert jaunâtre avec stries gris foncé bien visibles.
Queue	partie supérieure gris foncé. Partie inférieure : les deux premiers tiers jaunes et extrémité gris foncé.
Rémiges	Grandes : gris foncé avec liseré jaune pour le vexille externe. Secondaires : gris foncé avec liseré jaune à l'extrémité.
Couvertures alaires	Gris foncé. Barre alaire jaune bien visible.
Bec	Couleur chair flammé à la mandibule supérieure.
Yeux	Noirs.
Pattes, doigts	Chair.
Ongles	Couleur corne.



Photo Jean-Michel EYTORFF

***Tarin des aulnes femelle (Carduelis spinus)***  
**~ Mutation agate dilué ~**

**Taille du corps** : 11 cm

Hérédité : agate : récessif lié au sexe - dilué : dominant autosomal

Zones du plumage	Couleur
Calotte	Jaune verdâtre claire, striée de gris foncé.
Joues	Jaunes verdâtre lavées de gris.
Gorge	Grisâtre.
Poitrine	Grisâtre avec légères stries gris foncé.
Dos	Vert jaunâtre pâle avec stries dorsales gris foncé bien visibles.
Flancs	Grisâtres, très clairs, striés de gris foncé.
Croupion	Jaunâtre.
Queue	Partie supérieure gris foncé. Partie inférieure : le premier tiers est jaunâtre et le reste est gris foncé.
Rémiges	Grandes : gris foncé avec liseré jaune le long du vexille externe. Secondaires : gris foncé avec un liseré jaune à l'extrémité.
Couvertures	Gris foncé. Barre alaire jaunâtre.
Bec	Couleur chair flammé à la mandibule supérieure.
Yeux	Noirs.
Pattes, doigts	Couleur chair.
Ongles	Couleur corne.



Photo RBOF

***Tarin des aulnes mâle (Carduelis spinus)***  
**~ Mutation isabelle ~**

Taille du corps : 11 cm

Zones du plumage	Couleur
Vertex, occiput	Brun clair.
Traits sourciliers	Jaunes.
Joues	Brun clair lavées de jaune.
Gorge, poitrine	Jaunes. Bavette brun claire si elle existe.
Flancs	Jaunâtres avec stries brun clair.
Dos	Manteau brun clair très légèrement strié.
Ventre	Blanc sale.
Croupion	Jaune.
Queue	Deux premiers tiers jaunes et le reste est brun clair. Rectrices médianes entièrement brunes.
Rémiges	Grandes : brun clair avec liseré jaune. Bandes alaires et miroir jaune.
Couvertures alaires	Petites : brun clair. Moyennes : brun clair avec liseré jaune (bande alaire). Grandes : brun clair avec liseré jaune.
Bec	Chair, flammé de brun à l'extrémité de la mandibule supérieure.
Yeux	Bruns.
Pattes, doigts	Couleur chair.
Ongles	Couleur chair.

Photo F.O.I



***Tarin des aulnes femelle (Carduelis spinus)***  
**~ Mutation isabelle ~**

Taille du corps : 11 cm

Zones du plumage	Couleur
Front, vertex, occiput, dos	Blanc sale lavées de jaune et striés de brun clair.
Traits sourciliers	Jaune clair et peu visibles.
Joues	Jaunâtres striées de brun clair.
Gorge	Blanc sale
Poitrine	Blanc sale lavée de jaune pâle avec stries brun clair sur le haut de la poitrine.
Flancs	Blanc sale striés de brun clair.
Ventre	Blanc sale.
Croupion	Blanc sale lavé de jaune.
Queue	Premier tiers jaune et deux derniers tiers brun clair. Rectrices médianes entièrement brunes.
Ailes	Identiques aux ailes des mâles mais avec un jaune moins intense.
Bec	Chair, flammé de brun à l'extrémité de la mandibule supérieure.
Yeux	Bruns.
Pattes, doigts	Couleur chair.
Ongles	Couleur chair.



Photo KBOF

*Tarin des aulnes mâle (Carduelis spinus)*  
 ~ Mutation isabelle dilué ~

Taille du corps : 11 cm

Zones du plumage	Couleur
Vertex, occiput, joues	Jaunes, voilés de beige.
Traits sourciliers	Jaunes mais peu visibles.
Gorge, poitrine, dos, croupion	Jaunes, voilés de beige. Pas de stries.
Flancs	Jaunes légèrement striés de beige.
Ventre	Blanc sale.
Queue	Deux premiers tiers jaunes et le reste est beige clair. Rectrices médianes entièrement beiges.
Rémiges	Beige clair avec liserés jaunes.
Couvertures alaires	Jaunes avec liserés et extrémités beige clair. Barre alaire visible.
Bec	Chair, flammé de brun à l'extrémité de la mandibule supérieure.
Yeux	Bruns.
Pattes, doigts	Couleur chair.
Ongles	Couleur chair.



Photo Jean-Michel EYTORFF

*Tarin des aulnes femelle (Carduelis spinus)*  
 ~ Mutation isabelle dilué ~

Taille du corps : 11 cm

Zones du plumage	Couleur
Front, vertex, occiput	Beige clair lavés de jeune.
Traits sourciliers	Jaune clair.
Gorge, poitrine	Blanc sale avec le moins de jaune possible.
Dos	Manteau jaune lavé de beige et légèrement strié.
Flancs	Blanc sale striés de beige clair.
Ventre	Blanc sale.
Croupion	Jaune lavé de beige clair.
Queue	Premier tiers jaune et deux derniers tiers beiges. Rectrices médianes entièrement beiges.
Couvertures	Jaunes avec liserés et extrémités beiges.
Rémiges	Beiges avec liseré jaune.
Bec	Chair, flammé de brun à l'extrémité de la mandibule supérieure.
Yeux	Bruns.
Pattes, doigts	Couleur chair.
Ongles	Couleur chair.



Photo Jean-Michel EYTORFF

***Tarin des aulnes mâle (Carduelis spinus)***  
**~ Mutation ivoire ~**

**Taille du corps** : 11 cm

Photo A. Van Mingeroet

Zones du plumage	Couleur
Front, vertex, occiput, calotte	Noirs. Calotte légèrement pointillée de gris.
Joues, région auriculaire	Jaune ivoire grisâtre légèrement voilé.
Traits sourciliers	Jaune ivoire, partant de derrière l'œil et s'élargissant vers le cou.
Cou, dos	Nuque gris verdâtre avec de fines stries très foncées.
Gorge, poitrine, épaules	Vert gris. Certains mâles ont une petite bavette noire et régulière sur le haut de la gorge.
Flancs	Gris vert avec des stries noires bien régulières. La couleur devient plu claire vers l'arrière des flancs.
Ventre	Région anale légèrement grisâtre.
Croupion	Gris vert.
Queue	Deux premiers tiers des rectrices jaune ivoire et extrémité noire. Deux rectrices médianes noires.
Rémiges	Grandes rémiges noir brunâtre avec vexille externe jaune ivoire. Barre alaire et petit miroir jaune ivoire.
Bec	Couleur corne claire flammé de noir.
Yeux	Brun foncé.
Pattes, doigts	Couleur chair.
Ongles	Noirs.



***Tarin des aulnes femelle (Carduelis spinus)***  
**~ Mutation ivoire ~**

Taille du corps : 11 cm

Zones du plumage	Couleur
Front, vertex, occiput	Grisâtres avec de fines stries.
Joues, région auriculaire	Brunâtres, voilées de jaune ivoire.
Traits sourciliers	Beaucoup moins jaunes que chez le mâle et plutôt brun grisâtre.
Cou, dos, épaules	Grisâtres finement striés de noir brunâtre.
Gorge, poitrine, flancs	Grisâtre dans l'ensemble. Côtés de la poitrine et flancs avec un beau dessin strié régulier et net de couleur gris foncé.
Ventre	Grisâtre.
Croupion	Gris vert légèrement strié de gris foncé.
Queue	Premier tiers des rectrices jaune ivoire, le reste est noir gris. Deux rectrices médianes noir gris. Sous-caudales avec dessin écaillé.
Ailes	Gris foncé avec les mêmes marques que les mâles.
Bec	Couleur corne claire flammé de noir.
Yeux	Brun foncé.
Pattes, doigts	Couleur chair.
Ongles	Noirs.



Photo Bernard CORMELIAU

***Tarin des aulnes mâle (Carduelis spinus)***  
**~ Mutation agate ivoire ~**

**Taille du corps** : 11 cm

Zones du plumage	Couleur
Front, vertex, occiput, calotte	Gris foncé. Calotte pointillée de gris.
Joues, région auriculaire	Vertes lavées de gris.
Traits sourciliers	Jaune ivoire.
Dos	Manteau verdâtre voilé de gris avec des stries noires.
Gorge, poitrine, flancs	Vert jaunâtre ivoire. Flancs à stries grises très foncées. Gorge avec parfois une bavette gris foncé.
Croupion	Verdâtre.
Queue	Deux premiers tiers des rectrices jaune ivoire et extrémité gris très foncé. Deux rectrices médianes entièrement gris foncé.
Ailes	Grandes rémiges gris foncé avec bords externes liserés de jaune ivoire. Rémiges secondaires avec liseré grisâtre. Barre alaire et miroir jaune ivoire clair.
Bec	Couleur chair flammé.
Yeux	Noirs.
Pattes, doigts	Chair foncé.
Ongles	Foncés.



Photo Jean-Michel EYTORFF

***Tarin des aulnes femelle (Carduelis spinus)***  
**~ Mutation agate ivoire ~**

Taille du corps : 11 cm

Zones du plumage	Couleur
Front, vertex, occiput, calotte	Gris clair striés de noir.
Joues, région auriculaire	Grisâtres.
Traits sourciliers	Gris clair.
Dos	Manteau grisâtre strié de noir dilué.
Poitrine	Gris clair strié de noir dilué.
Flancs	Couleur de fond gris clair avec des stries d'un gris très foncé.
Croupion	Grisâtre, légèrement strié de gris foncé.
Queue	Le premier tiers des rectrices jaune ivoire et le reste est gris très foncé. Deux rectrices médianes entièrement gris très foncé.
Ailes	Grandes rémiges gris foncé avec bords externes liserés de jaune ivoire. Rémiges secondaires avec liseré grisâtre. Barre alaire et miroir jaune ivoire clair.
Bec	Couleur chair flammé.
Yeux	Noirs.
Pattes, doigts	Chair foncé.
Ongles	Foncés.




Photo Jean-Michel CYTORFF

# Sizerin flammé

*Carduelis flammea cabaret*  
1<sup>ère</sup> année




*Carduelis flammea cabaret*  
adulte



*Carduelis flammea flammea*  
1<sup>ère</sup> année



*Carduelis flammea flammea*  
adulte



Standard COM/OMJ

***Sizerin cabaret (Carduelis flammae cabaret)***  
 ~ Phénotype sauvage ~

Taille du corps : 11.5 cm

Zones du plumage	Couleur
Front	Brunâtre. La moitié du vertex est rouge carmin ou jaune brun selon les spécimens.
Joues, région auriculaire	Brun foncé. Dessin en forme de demi-lune.
Traits sourciliers	Couleur légèrement brunâtre. Etroits et réguliers. Du dessus des yeux à la nuque.
Cou, dos, épaules	Bruns avec des stries étroites et régulières brun foncé.
Gorge	Brun chaud. Petite bavette brun foncé.
Poitrine	Haut et côtés rose carmin, parfois brun chaud.
Flancs, ventre	Blanc sale. Flancs régulièrement striés de fines raies brun foncé qui partent à la hauteur des épaules et qui descendent tout le long des flancs.
Ailes, queue	Grandes rémiges et rectrices brun très foncé, liserées de brun très pâle aux extrémités. Deux barres alaires beige léger.
Croupion	Lavé de rose carmin ou brun chaud, strié de brun foncé.
Bec	Fin et pointu. Mandibule supérieure brunâtre et inférieure jaunâtre.
Yeux	Brun foncé.
Pattes, doigts	Brun foncé.
Ongles	Noirs.

Photo UOF



*Sizerin flammé (Carduelis flammæ flammæ)*  
~ Phénotype sauvage ~

Différence avec le sizerin cabaret :

- Plus grand en taille (13 - 15 cm)
- Couleur de fond plus pale, brun beige
- Stries brunes légèrement plus claires
- Barres alaires plus claires et plus visibles
- Tache plus claire dans le dos (caractéristique de l'espèce)



Photo UOF



## *Sizerin* *Mutation brune*

Taille du corps : 12 - 15 cm

Zones du plumage	Couleur
Front	Brun beige. Vertex rouge rosé.
Joues, région auriculaire	Brunes.
Traits sourciliers	Beiges.
Dos	Brun chaud avec des stries brun foncé étroites et régulières.
Gorge	Brune avec bavette d'un brun plus foncé.
Poitrine, flancs	Brun clair. Stries brun chaud sur le haut de la poitrine et des épaules vers l'arrière pour les flancs. Chez le mâle adulte, la poitrine peut être brun lavé de rose.
Ventre	Blanc sale.
Ailes, queue	Grandes rémiges et rectrices brunes avec liseré beige au bout des plumes. Barres alaires légèrement plus claires.
Croupion	Brun strié de brun chaud et lavé de rose.
Bec	Fin et pointu. Mandibule supérieure brunâtre et inférieure jaunâtre.
Pattes, doigts	Couleur chair.
Yeux, ongles	Brun foncé.



Photo FOI



Photo UCP

Dimorphisme sexuel : teintes et marques identiques chez les femelles mise à part la poitrine et les flancs légèrement plus clairs. Pas de rose sur la poitrine et le croupion.

## *Sizerin* ~ *Mutation Pastel (ex-agate)* ~

Taille du corps : 12 - 15 cm

Zones du plumage	Couleur
Front	Gris beige. La moitié du vertex est rouge rose ou parfois jaune brun.
Joues, région auriculaire	Gris brun lavé de rose. Dessin en forme de demi-lune.
Traits sourciliers	Gris beige. Etroits et réguliers, du dessus des yeux à la nuque.
Dos, cou, épaules	Gris clair avec stries régulières gris foncé.
Gorge	Gris clair avec petite bavette gris foncé.
Poitrine	Gris clair, parfois rosée, avec stries grises sur le haut.
Flancs	Gris clair avec stries grises régulières du haut de la poitrine et descendant le long des flancs.
Ventre	Blanc sale.
Ailes, queue	Grandes rémiges et rectrices gris foncé avec liseré gris clair à l'extrémité des plumes. Deux barres alaires gris clair.
Croupion	Gris clair strié de gris foncé.
Bec	Jaunâtre avec mandibule supérieure flammée.
Yeux	Noirs.
Pattes, doigts	Grisâtres.
Ongles	Noirs.



Photo Bernard COMELIATU



Photo P'OI

**Sizerin**  
 ~ *Mutation brun pastel (ex-isabelle)* ~

Taille du corps : 12 - 15 cm

Zones du plumage	Couleur
Front	Beige. La moitié du vertex est rouge rose ou parfois jaune brun.
Joues, région auriculaire	Beiges lavées de rose. Lorums beiges.
Traits sourciliers	Beiges.
Dos	Beige clair avec stries brun clair.
Gorge	Beige clair avec petite bavette brun clair.
Poitrine	Beige clair, parfois rose, avec stries brun clair sur le haut.
Flancs	Beige clair striés de brun clair du haut de la poitrine et descendant le long des flancs.
Ventre	Blanc sale.
Ailes	Rémiges primaires beige clair. Rémiges secondaires brun clair. Couvertures brun clair avec extrémités beige clair formant les bandes alaires.
Queue	Rectrices beige clair avec liseré plus clair très peu visible.
Croupion	Beige clair striés de brun clair, parfois lavé de rose.
Bec	Jaunâtre avec mandibule supérieure flammée.
Yeux	Brun foncé.
Pattes, doigts, ongles	Couleur chair.

Photo Philippe ROCHER



**Sizerin**  
~ *Mutation écaillée (ex- pastel)*

Taille du corps : 12 - 15 cm

Zones du plumage	Couleur
Tête	Brune striée de brun foncé.
Joues	Brunes avec région auriculaire brun foncé.
Dos, flancs	Bruns striés de brun foncé.
Gorge	Petite bavette grisâtre.
Poitrine	Brun chaud.
Ailes, queue	Rémiges primaires et secondaires brun foncé avec liseré beige. Couvertures brunes avec liseré brun roux. Barres alaires brun beige bien visibles.
Queue	Brune avec liseré beige.
Croupion	Beige clair striés de brun foncé.
Bec	Jaune avec bout de la mandibule supérieure brune.
Yeux	Noirs.
Pattes, doigts	Chair foncé.
Ongles	Noirs.



Photo Drizsmans

**Sizerin**  
~ *Mutation brun écaillé (ex-brun pastel)*~

Taille du corps : 12 - 15 cm

Zones du plumage	Couleur
Front	Brun clair avec calotte rouge.
Joues	Brunes.
Nuque	Brune avec légères stries plus brunes.
Dos	Brun avec stries plus brunes.
Gorge	Bavette grisâtre.
Poitrine	Brune sans stries visibles.
Flancs	Bruns avec stries légèrement visibles.
Ventre	Blanc sale.
Ailes	Rémiges primaires gris beige avec liserés brun clair. Rémiges secondaires et couvertures gris beige avec liserés bruns très visibles.
Queue, croupion	Gris beige avec liserés bruns.
Bec	Jaune.
Yeux	Noir brun.
Pattes, doigts, ongles	Couleur chair.



**Sizerin**  
~ *Mutation facteur foncé* ~

Taille du corps : 12 - 15 cm

Zones du plumage	Couleur
Front	Brun foncé avec calotte rouge.
Traits sourciliers	Bruns et légèrement visibles.
Joues	Brunes, très foncées.
Nuque	Brun clair avec des stries brunes.
Lorums	Noirs.
Dos, épaules, cou	Brun foncé avec des stries étroites et régulières noir brun.
Gorge	Brun foncé avec une bavette noire.
Poitrine	Brun foncé avec des stries noir brun sur les côtés et un dessin écaillé noir brun au milieu.
Flancs	Couleur de fond très foncée, stries brun noir fines et régulières partant à la hauteur des épaules et descendant tout le long des flancs.
Ventre	Blanc sale voilé de brun.
Ailes	Rémiges primaires brun très foncé avec liseré clair très étroit. Deux barres alaires brunes.
Queue, croupion	Brun très foncé. Croupion strié de brun noir. Rectrices avec un liseré brun à l'extrémité.
Bec	Foncé avec la base de la mandibule inférieure jaunâtre.
Yeux, pattes, doigts, ongles	Noirs.



Photo Philippe ROCHER

**Sizerin**  
~ *Mutation pastel facteur foncé (ex-agate foncé)*~

Taille du corps : 12 - 15 cm

Zones du plumage	Couleur
Front, traits sourciliers	Gris beige. Moitié du vertex rouge rose ou jaune brun. Traits sourciliers étroits et réguliers
Joues, région auriculaire	Gris bun lavé de rose, dessin en forme de demi-lune.
Lorums	Grisâtres.
Dos, épaules, cou, croupion	Gris foncé avec des stries et régulières gris foncé. Stries du dos, du cou et des épaules entrecoupées
Gorge	Gris foncé avec une petite bavette gris foncé.
Poitrine	Gris foncé avec des stries grises sur le haut de la poitrine. Elle peut être rose chez les mâles adultes.
Flancs	Gris foncé et régulièrement striés de gris. Les stries partent du haut de la poitrine et descendent le long des flancs.
Ventre	Blanc sale.
Ailes	Grandes rémiges gris foncé liserées de gris clair à l'extrémité des plumes. Deux barres alaires gris foncé.
Queue	Rectrices gris foncé liserées de gris foncé à leur extrémité.
Bec	Jaunâtre avec mandibule supérieure flammée.
Pattes, doigts	Grisâtres.
Yeux, ongles	Noirs.




Photo KBOF

**Sizerin**  
*~ Mutation brun facteur foncé ~*

Taille du corps : 12 - 15 cm

Zones du plumage	Couleur
Front	Brun avec le vertex rouge foncé.
Joues, région auriculaire	Brun foncé.
Lorums	
Dos	Brun foncé avec un léger dessin dorsal.
Gorge	Brun foncé avec une très grande bavette plus foncée.
Poitrine	Brun foncé avec des stries visibles sur le haut de la poitrine.
Flancs	Bruns striés de fines raies brun foncé partant des épaules vers l'arrière.
Ventre	Brun beige.
Ailes	Grandes rémiges brun foncé avec un très petit liseré beige. Barre alaire pratiquement invisible.
Croupion	Brun foncé strié.
Queue	Rectrices brun foncé avec un très petit liseré beige.
Bec	Jaunâtre flammé de brun
Pattes, doigts, ongles	Bruns.
Yeux	Brun foncé.



**Sizerin**  
~ *Mutation phaéo* ~

Taille du corps : 12 - 15 cm

Zones du plumage	Couleur
Front	Brun clair non-strié, avec la calotte rouge ou orange.
Nuque	Blanchâtre striée de brun.
Dos	Blanchâtre écaillé de brun.
Gorge, ventre	Blanchâtre.
Poitrine	Blanchâtre avec des écailles brunes sur le haut.
Flancs	Blanchâtres écaillés de brun.
Ailes	Rémiges primaires blanches avec léger liseré externe brun. Rémiges secondaires blanche avec un liseré brun plus large. Couvertures blanchâtres avec un large liseré brun à l'extrémité. Scapulaires blanchâtres avec des écailles brunes.
Croupion	Blanc avec de larges liserés bruns.
Queue	Rectrices blanches avec un liseré brun.
Bec	Jaune à base blanchâtre (comme les contours des yeux et la bavette).
Pattes, doigts	Couleur chair.
Ongles	Couleur corne.
Yeux	Rouges.



## *Sizerin blanchâtre (Carduelis hornemanni)* ~ Phénotype sauvage ~

Taille du corps : 14 cm

Zones du plumage	Couleur
BEC	Conique, fin et pointu de couleur de corne jaunâtre. La mandibule supérieure est plus foncée que l'inférieure.
YEUX	Noir
TETE	Ronde, bien enchâssée dans les épaules. Fine bande frontale et lorums brun-noirâtre. Tache rose carmin en forme de casque partant du front et couvrant la moitié du crâne. Ligne oculaire gris-brun surmontée d'un fin sourcil gris-beige. Arrière du crâne et nuque : gris-beige, striés de noirâtre. Dessin des joues légèrement marqué.
DOS	Beige-grisâtre marqué régulièrement de stries brun noir, avec une zone plus claire au centre.
GORGE	Petite bavette noir-brun au menton. Gorge blanchâtre, un très léger reflet rose peut parfois apparaître,
POITRINE	Blanchâtre comme la gorge, peut être aussi légèrement rose
FLANCS	Beige-grisâtre très clair, striés de brun-noir
VENTRE	Blanc.
AILES	Grandes rémiges : noirâtres, finement liserées de brun clair. Rémiges secondaires : noirâtres, portant un liseré gris-beige plus large. Couvertures : noirâtres, bordées de blanc sale formant une double barre alaire.
CROUPION	Blanchâtre, légèrement strié ou lavé de rose accepté
QUEUE	Rectrices : noirâtres, portant un liseré gris-beige
PATTES et DOIGTS	Brun-noir.
ONGLES	Noir
FORME GENERALE	Assez ronde, trapue et élégante



# Chardonneret élégant

(*Carduelis carduelis carduelis*)

Mâle



Femelle



# Chardonneret élégant (major)

(*Carduelis carduelis major*)



**Taille 14/16 cm**

- marque de nuque blanche et importante,
- joues, gorge, champignons blancs,
- brides du casque larges, très noires contournant l'arrière de la joue,
- dessin pectoral chamois intense et présentant souvent des traces noirâtres  
sont larges et bien nettes,
- flancs chamois bien marqués,
- croupion blanc lavé de beige.

# Chardonneret élégant (britannica)

(*Carduelis carduelis britannica*)



**Taille : 12/ 12,5 cm**

- marque de nuque étroite, blanc sale,
- gorge et joues, fortement lavées de beige,
- champignons et ventre blancs et ternes,
- flancs et dessin pectoral brun,
- manteau brun foncé,
- croupion blanc sale fortement lavé de brun.

# Chardonneret élégant (parva)

(*Carduelis carduelis parva*)



**Taille 10,5/11 cm**

- marque de nuque blanche et étroite,
- joues, gorge, champignons et ventre blancs,
- dessin pectoral et flancs chamois,
- croupion blanc lavé de beige,
- bec long, fort et pointu qui peut parfois paraître disproportionné avec la taille de l'oiseau

# Chardonneret élégant (tschusii)

(*Carduelis carduelis tschusii*)



**Taille 11 cm,**

- marque de nuque quasiment inexistante,
- joues lavées de brun,
- gorge, champignons et ventre blancs,
- dessin pectoral et flancs chamois,
- manteau brun jusqu'à la base du casque
- croupion blanc lavé de beige,
- bec long, fort et pointu (moins long que chez parva)

## *Chardonneret élégant (Carduelis carduelis)* ~ Phénotype sauvage ~

Taille du corps : 11 – 16 cm

Zones du plumage	Couleur
Tête	Masque rouge écarlate englobant le front, le menton et la moitié des joues jusqu'à l'œil. Derrière le masque, large tache blanche (parfois brune selon les sous-espèces) sur les côtés de la tête et la gorge.
Cou	Collier blanc dans la nuque séparant le noir de la nuque et le brun du dos.
Dos	Brun foncé.
Calotte, nuque, lorums épaules, ailes	Noirs. Large barre alaire jaune vif. Points blancs à l'extrémité de chaque rémige.
Poitrine	Brune sur les côtés avec un champignon blanc au centre.
Flancs	Brunâtre en s'éclaircissant vers le ventre.
Ventre	Blanc.
Croupion	Blanchâtre.
Queue	Noire. Points blancs à l'extrémité de chaque rectrice. Grande tache blanche à la partie inférieure des rectrices externes.
Yeux	Brun foncé.
Bec, pattes, doigts	Couleur chair. Extrémité du bec noire et effilée.
Ongles	Foncés.



Photos Philippe ROCHER



Dimorphisme sexuel : chez la femelle, couverture des épaules brun verdâtre et non noire comme chez les mâles.

## *Chardonneret élégant* ~ *Mutation brun* ~

Taille du corps : 11 – 16 cm

Zones du plumage	Couleur
Tête	Masque rouge orange englobant le front, le menton, et la moitié des joues jusqu'à l'œil. Derrière le masque, large tache blanche (parfois brune selon les sous-espèces) sur les côtés de la tête et la gorge.
Calotte, nuque, épaules, lorums	Brun foncé.
Cou	Collier blanc dans la nuque séparant le brun de la nuque et le brun du dos.
Dos	Brun chaud uniforme.
Poitrine	Brun chaud avec champignon blanc au centre.
Flancs	Bruns en s'éclaircissant vers l'arrière.
Ventre	Blanc sale.
Ailes	Brun foncé avec large barre alaire jaune vif. Points blancs à l'extrémité de chaque rémige.
Croupion	Blanchâtre lavé de brun.
Queue	Brun foncé, avec pointillés blancs à l'extrémité des rectrices. Grande tache blanche à la partie inférieure des rectrices externes.
Yeux	Brun foncé.
Pattes, doigts, ongles, bec	Couleur chair.

Photo UOF



Dimorphisme sexuel : chez la femelle, couverture des épaules brun verdâtre et non brune comme chez les mâles.

**Standard COM/OMJ**

## *Chardonneret élégant* ~ *Mutation agate* ~

Taille du corps : 11 – 16 cm

Zones du plumage	Couleur
Tête	Masque rouge écarlate. Derrière le masque, large tache blanche sur les côtés de la tête et la gorge.
Calotte, nuque, épaules, lorums	Noirs.
Cou	Collier blanc dans la nuque séparant le noir de la nuque et le gris beige du manteau.
Dos	Gris beige uniforme.
Poitrine	Gris beige avec champignon blanc au centre.
Flancs	Gris beige en s'éclaircissant vers l'arrière.
Ventre	Blanc sale.
Ailes	Noires avec large barre alaire jaune vif. Points blancs à l'extrémité de chaque rémige.
Croupion	Blanchâtre lavé de gris beige.
Queue	Noire, avec pointillés blancs à l'extrémité des rectrices. Grande tache blanche à la partie inférieure des rectrices externes.
Yeux	Brun foncé.
Pattes, doigts, bec	Couleur chair. Extrémité du bec flammée de noir.
Ongles	Foncés.



Photo UOF

Dimorphisme sexuel : chez la femelle, couverture des épaules brun verdâtre et non brune comme chez les mâles.

## *Chardonneret élégant* ~ *Mutation pastel* ~

Taille du corps : 11 – 16 cm

Zones du plumage	Couleur
Tête	Masque rouge orange avec dessin gris sur le crâne et la nuque.
Joues	Blanc sale.
Gorge	Blanc sale sous le masque.
Dos, flancs	Gris brun clair.
Poitrine	Gris brun clair avec champignon blanc au centre.
Ailes	Rémiges primaires et secondaires gris foncé le plus égal possible avec extrémités blanches. Miroir jaune.
Couvertures	Gris foncé.
Croupion	Gris brun clair se transformant en blanc sale vers la queue.
Queue	Rectrices grises avec taches blanches sur les deux rectrices externes.
Yeux	Noirs.
Pattes, doigts, ongles, bec	Couleur chair.



## *Chardonneret élégant* ~ *Mutation isabelle* ~

Taille du corps : 11 – 16 cm

Zones du plumage	Couleur
Tête	Masque rouge orange englobant le front, le menton, et la moitié des joues jusqu'à l'œil. Derrière le masque, large tache blanche (parfois brune selon les sous-espèces) sur les côtés de la tête et la gorge.
Calotte, nuque, lorums	Brun beige.
Cou	Collier blanc séparant le brun beige de la nuque et le brun beige du manteau.
Dos, flancs	Brun beige. Les flancs s'éclaircissent vers l'arrière.
Epaules	Brunes.
Poitrine	Brun beige avec champignon blanc au centre.
Ventre	Blanc sale.
Ailes	Brun beige avec large barre alaire jaune vif. Points blancs à l'extrémité de chaque rémige.
Croupion	Blanchâtre lavé de gris.
Queue	Brun beige, avec pointillés blancs à l'extrémité des rectrices. Grande tache blanche à la partie inférieure des rectrices externes.
Yeux	Bruns.
Pattes, doigts, ongles, bec	Couleur chair.



Photo UOF

Dimorphisme sexuel : chez la femelle, couverture des épaules brun verdâtre et non brune comme chez les mâles.

## *Chardonneret élégant* ~ *Mutation satiné* ~

Taille du corps : 11 – 16 cm

Zones du plumage	Couleur
Tête	Masque rouge orange englobant le front, le menton, et la moitié des joues jusqu'à l'œil. Derrière le masque, large tache blanche (parfois brune selon les sous-espèces) sur les côtés de la tête et la gorge.
Calotte, nuque, lorums	Beiges.
Cou, gorge	Blancs. Collier blanc séparant le beige de la nuque et le beige du dos.
Dos	Blanc voilé de beige.
Epaules	Beiges.
Poitrine	Blanc sale voilé de beige avec champignon banc visible au centre.
Flancs	Blanc sale légèrement voilé de beige.
Ventre	Blanc sale.
Ailes	Beiges, avec large barre alaire jaune vif. Points blancs à l'extrémité de chaque rémige.
Croupion	Blanchâtre lavé de beige.
Queue	Beige, avec pointillés blancs à l'extrémité des rectrices. Grande tache blanche à la partie inférieure des rectrices externes.
Yeux	Rouges.
Pattes, doigts, ongles, bec	Couleur chair.



***Chardonneret élégant***  
***~ Mutation blanc avec masque orange ~***

**Taille du corps** : 11 – 16 cm

Zones du plumage	Couleur
Tête	Blanche. Masque orange qui ne va pas jusqu'à la base du bec.
Dos	Blanc.
Poitrine	Blanche.
Flancs	Blancs.
Rémiges	Rémiges primaires blanches avec un liseré jaune dans leur partie médiane. Rémiges secondaires blanches.
Couvertures	Couvertures primaires blanches avec quelques plumes jaunes. Couvertures secondaires et tertiaires blanches.
Croupion	Blanc.
Queue	Blanche avec un léger liseré jaune.
Bec	Couleur chair, légèrement flammé à l'extrémité de la mandibule supérieure.
Yeux	Noirs.
Pattes, doigts	Couleur chair.
Ongles	Blancs.



Photo KBOF

## *Chardonneret élégant* ~ *Mutation tête blanche* ~

Taille du corps : 11 – 16 cm

Zones du plumage	Couleur	
Tête	Absence de casque noir remplacé par une couleur blanche la plus uniforme possible (crâne, lorums, nuque). Seules subsistent de chaque côté de la tête les traces des brides du casque, de forme triangulaire et de couleur rouge ou orange.	
Masque	Rouge lumineux, qui peut-être plus étendu sur la face et le front.	
Cou, gorge	Mêmes caractéristiques que le phénotype sauvage, avec des miroirs alaires qui s'étendent aux grandes couvertures et pouvant remonter à la pliure de l'épaule (il est aussi visible à l'envers de l'aile).	
Dos		
Epaules		
Poitrine		
Flancs		
Ventre		
Ailes		
Croupion		Cette mutation récessive autosomale a été transposée aux autres mutations existantes (brun, agate, etc.)
Queue		
Yeux		
Pattes, doigts, ongles, bec		



## *Chardonneret élégant* ~ *Mutation jaune* ~

Taille du corps : 11 – 16 cm

Zones du plumage	Couleur
Tête	<p>L'ensemble du plumage présente une suffusion jaune, visible surtout sur les parties dépourvues de pigments mélaniques : joues, nuque, poitrail, croupion.</p> <p>La couleur jaune doit être pure, intense, le plus uniforme possible.</p> <p>Le masque facial est très lumineux, plus étendu et plus diffus que chez les sujets présentant le patron classique.</p> <p>Cette mutation à hérédité dominante a été transposée à toutes les variétés existantes.</p>
Calotte, nuque, lorums	
Cou, gorge	
Dos	
Epaules	
Poitrine	
Flancs	
Ventre	
Ailes	
Croupion	
Queue	
Yeux	
Pattes, doigts, ongles, bec	



***Chardonneret élégant***  
**~ Mutation aminet ~ (antérieurement dénommé à tort Eumo)**

**Taille du corps** : 11 – 16 cm

Zones du plumage	Couleur
Tête	Masque rouge écarlate englobant le front, le menton, et la moitié des joues jusqu'à l'œil. Derrière le masque, large tache blanche (parfois brune selon les sous-espèces) sur les côtés de la tête et la gorge.
Calotte, nuque, lorums	calotte et lorums le plus noir possible. Nuque blanche.
Cou, gorge	Collier blanc formant une séparation entre le noir de la nuque et le manteau beige-rosé.
Dos	De couleur beige-rosé.
Epaules	marbrées brun-noir chez le mâle et brun verdâtre chez la femelle.
Poitrine	Beige avec voile jaunâtre le champignon est quasiment invisible.
Flancs	Beige très clair voilé de blanc.
Ventre	Blanc.
Ailes	Rémiges noires, avec large barre alaire jaune vif. Points blancs à l'extrémité de chaque rémige.
Croupion	Le plus blanc possible.
Queue	noire, avec points blancs à l'extrémité des rectrices. Grande tache blanche à la partie intérieure des rectrices externes.
Yeux	Brun foncé.
Pattes, doigts, ongles, bec	Couleur chair.



Photo KBOF

# Comparaison entre agate et aminet



# Verdier d'Europe (*Carduelis chloris chloris*)

Mâle



Femelle



# Verdier d'Europe

(*Carduelis chloris aurantiventris*)

Taille 14 - 16 cm,



- couleur verte plus lumineuse que chez chloris chloris
- gorge et face ventrale fortement lavées de jaune
- bec et pattes plus clairs que chez chloris chloris
- plus grand et plus coloré que chloris chloris



***Verdier d'Europe mâle (Carduelis chloris chloris)***  
**~ Phénotype sauvage ~**

Taille du corps : 13/15 cm

Zones du plumage	Couleur
Tête	Large, massive, avec le cou bien rempli. Front vert lumineux. Zone loreale et moustache gris-vert
Joues	Gris cendré.
Gorge, épaules	Vert jaunâtre.
Dos	Vert olive avec reflets brunâtres.
Poitrine, flancs	Vert olive.
Ventre	Gris blanchâtre.
Ailes	Grandes rémiges noir brunâtre avec vexille externe jaune vif. Rémiges secondaires grises avec un liseré noir brunâtre à l'extrémité.
Queue	Rectrices jaunes à la base et noir brunâtre à l'extrémité avec un liseré gris le long du vexille externe. Les deux rectrices médianes sont noir brunâtre. Queue courte avec l'extrémité fourchue.
Yeux	Brun foncé.
Bec	Couleur chair, flammé de brun. Gros et conique.
Pattes, doigts	Couleur chair.
Ongles	Chair foncé.



Photo UOF

***Verdier d'Europe femelle (Carduelis chloris chloris)***  
**~ Phénotype sauvage ~**

Taille du corps : 13/15 cm

Zones du plumage	Couleur
<b>Tête</b>	brun grisâtre. Large, massive, avec le cou bien rempli.
<b>Joues</b>	Gris cendré.
<b>Gorge, épaules</b>	Gris-vert.
<b>Dos</b>	brun grisâtre marqué de stries plus foncées.
<b>Poitrine, flancs</b>	brun grisâtre strié.
<b>Ventre</b>	Gris blanchâtre.
<b>Ailes</b>	Grandes rémiges noir brunâtre avec vexille externe jaune. Rémiges secondaires grises avec un liseré noir brunâtre à l'extrémité. Liseré moins large que chez le mâle
<b>Queue</b>	Rectrices jaunes à la base et noir brunâtre à l'extrémité avec un liseré gris le long du vexille externe. Les deux rectrices médianes sont noir brunâtre. Queue courte avec l'extrémité fourchue. Miroir moins large que chez le mâle
<b>Yeux</b>	Brun foncé.
<b>Bec</b>	Couleur chair, flammé de brun. Gros et conique.
<b>Pattes, doigts</b>	Couleur chair.
<b>Ongles</b>	Chair foncé.



## *Verdier d'Europe mâle* ~ *Mutation isabelle* ~

Taille du corps : 13/15 cm

Zones du plumage	Couleur
<b>Tête</b>	Jaunâtre.
<b>Couronne, joues, moustaches</b>	Beiges.
<b>Gorge</b>	Jaune.
<b>Dos</b>	Jaune avec léger voile beige bien réparti.
<b>Poitrine, flancs</b>	Jaune avec un voile beige.
<b>Ventre</b>	Jaune devenant blanc vers l'anus.
<b>Ailes</b>	Grandes rémiges brunes avec vexille externe jaune et liseré beige à l'extrémité. Rémiges secondaires brunes avec un large liseré beige.
<b>Couvertures</b>	Grandes couvertures beiges. Petites et moyennes couvertures jaunes.
<b>Croupion</b>	Jaune.
<b>Queue</b>	Deux premiers tiers des rectrices jaunes et dernier tiers brun avec liseré beige à l'extrémité sauf pour les deux rectrices médianes qui n'ont pas de jaune.
<b>Yeux</b>	Brun foncé (yeux isabelle).
<b>Bec</b>	Couleur chair.
<b>Pattes, doigts</b>	Couleur chair.
<b>Ongles</b>	Couleur chair.

Remarque : le voile beige est moins visible chez les mâles adultes.



## *Verdier d'Europe femelle* ~ *Mutation isabelle* ~

Taille du corps : 13/15 cm

Zones du plumage	Couleur
<b>Tête</b>	Jaunâtre.
<b>Couronne, joues, moustaches</b>	Beiges.
<b>Gorge</b>	Vert jaunâtre.
<b>Dos</b>	Vert jaunâtre avec léger voile beige bien réparti.
<b>Poitrine, flancs</b>	Vert jaunâtre avec un voile beige.
<b>Ventre</b>	Beige clair.
<b>Ailes</b>	Grandes rémiges brun beige avec vexille externe jaune clair et liseré beige clair à l'extrémité. Rémiges secondaires brun beige.
<b>Couvertures</b>	Grandes couvertures brun beige. Petites et moyennes couvertures vert jaunâtre lavé de beige.
<b>Croupion</b>	Vert jaunâtre.
<b>Queue</b>	Deux premiers tiers des rectrices jaune pâle et dernier tiers brun avec liseré beige à l'extrémité sauf pour les deux rectrices médianes qui n'ont pas de jaune.
<b>Yeux</b>	Brun foncé (yeux isabelle).
<b>Bec</b>	Couleur chair.
<b>Pattes, doigts</b>	Couleur chair.
<b>Ongles</b>	Couleur chair.

Remarque : la couleur de fond jaune est plus visible chez les adultes.



Photo F'OI

## *Verdier d'Europe mâle* ~ Mutation agate ~

Taille du corps : 13/15 cm

Zones du plumage	Couleur
Tête	Vert jaunâtre.
Couronne, joues, moustaches	Gris.
Gorge	Vert jaunâtre.
Dos	Vert avec léger voile gris bien régulier.
Poitrine, flancs	Vert jaunâtre avec un voile gris.
Ventre	Vert jaunâtre.
Ailes	Grandes rémiges gris foncé avec vexille externe jaune et liseré gris clair à l'extrémité. Rémiges secondaires gris foncé avec un large liseré gris clair.
Couvertures	Grandes couvertures gris argenté. Petites et moyennes couvertures vert jaunâtre.
Croupion	Vert jaunâtre.
Queue	Deux premiers tiers des rectrices jaunes et dernier tiers gris foncé avec liseré gris clair sauf pour les deux rectrices médianes qui n'ont pas de jaune.
Yeux	Noirs.
Bec	Couleur chair.
Pattes, doigts	Couleur chair.
Ongles	Couleur chair.



Photo UOF

Remarque : le voile gris est moins visible chez les mâles adultes.

## *Verdier d'Europe femelle* ~ Mutation agate ~

Taille du corps : 13/15 cm

Zones du plumage	Couleur
Tête	Couronne vert jaunâtre striée de gris. Joues vert jaunâtre lavées de gris. Moustaches grises.
Gorge	Gris clair.
Dos	Vert avec dessin strié gris bien visible.
Poitrine, flancs	Gris clair. Poitrine avec dessin strié gris sur les côtés.
Ventre	Gris clair.
Ailes	Grandes rémiges gris foncé avec vexille externe jaune clair et liseré gris clair à l'extrémité. Rémiges secondaires gris foncé avec un large liseré gris brun.
Couvertures	Grandes couvertures gris brun. Petites et moyennes couvertures vert lavé de gris.
Croupion	Vert jaunâtre voilé de gris
Queue	Deux premiers tiers des rectrices jaune clair et dernier tiers gris foncé avec liseré gris clair à l'extrémité sauf pour les deux rectrices médianes qui n'ont pas de jaune.
Yeux	Noirs.
Bec	Couleur chair.
Pattes, doigts	Couleur chair.
Ongles	Couleur chair.

Remarque : la couleur de fond jaune est plus visible chez les adultes.

Photo KBOF



## *Verdier d'Europe mâle* ~ *Mutation brun* ~

Taille du corps : 13/15 cm

Zones du plumage	Couleur
Tête	Brun jaunâtre avec un voile gris brun sur les joues. Moustaches plus foncées que les joues. Sourcils plus clairs.
Dos	Brun jaunâtre.
Poitrine	Jaune brun.
Flancs	Bruns jaunâtres.
Ventre	Jaunâtre.
Ailes	Grandes rémiges brunes avec vexille externe jaune et liseré beige à l'extrémité. Rémiges secondaires brun grisâtre.
Couvertures	Grandes couvertures brun grisâtre. Petites et moyennes couvertures brun jaunâtre.
Croupion	Olive.
Queue	Deux premiers tiers des rectrices jaunes et dernier tiers brun avec liseré beige sauf pour les deux rectrices médianes qui n'ont pas de jaune.
Yeux	Bruns.
Bec	Couleur chair.
Pattes, doigts	Couleur chair.
Ongles	Couleur chair.

Photo Philippe ROCHER



Remarque : les mâles adultes ont une couleur de fond jaune, plus visible sur la poitrine.

***Verdier d'Europe femelle***  
***~ Mutation brun ~***

Taille du corps : 13/15 cm

Zones du plumage	Couleur
Tête	Brun chaud avec moustaches visibles.
Gorge	brun jaunâtre.
Dos	Brun chaud.
Poitrine	Brune.
Flancs	Brun chaud.
Ventre	Blanc sale.
Ailes	Grandes rémiges brunes avec petit vexille externe jaune et liseré beige à l'extrémité. Rémiges secondaires brunes avec un voile gris.
Couvertures	Grandes couvertures brunes avec un voile gris. Petites et moyennes couvertures brun chaud.
Croupion	Brun jaunâtre.
Queue	Premier tiers des rectrices jaune et deux derniers tiers bruns avec liseré beige à l'extrémité sauf pour les deux rectrices médianes qui n'ont pas de jaune.
Yeux	Bruns.
Bec	Couleur chair.
Pattes, doigts	Couleur chair.
Ongles	Couleur chair.

Photo UOF



## *Verdier d'Europe mâle* ~ *Mutation satiné* ~

Taille du corps : 13/15 cm

Zones du plumage	Couleur
Tête	Jaune.
Couronne, joues	Beige très clair.
Gorge, croupion	Jaune.
Dos	Jaune avec un voile beige très clair, sans stries.
Poitrine	Jaune avec un voile beige très clair sur les côtés.
Flancs	Jaune avec un voile beige très clair.
Ventre	Blanc sale.
Ailes	Grandes rémiges beiges avec vexille externe jaune et liseré beige très clair à l'extrémité. Rémiges secondaires beige clair.
Couvertures	Grandes couvertures beige clair. Petites et moyennes couvertures jaunes.
Queue	Deux premiers tiers des rectrices jaune doré et dernier tiers beige sans liseré sauf pour les deux rectrices médianes qui n'ont pas de jaune.
Yeux	Rouges.
Bec	Couleur chair.
Pattes, doigts	Couleur chair.
Ongles	Couleur chair.



Photo FOI

Remarque : les mâles adultes ont une couleur de fond est plus jaune sur la poitrine.

***Verdier d'Europe femelle***  
***~ Mutation satiné ~***

**Taille du corps** : 13/15 cm

Zones du plumage	Couleur
Tête	Jaune clair.
Couronne, joues	Beige très clair.
Gorge	Jaune clair.
Dos	Jaune clair avec un voile beige très clair. Présence d'un léger dessin de stries beiges.
Poitrine, flancs	Jaune clair avec un voile beige très clair.
Ventre	Blanc sale.
Ailes	Grandes rémiges beiges avec vexille externe jaune et liseré beige très clair à l'extrémité. Rémiges secondaires beige clair.
Couvertures	Grandes couvertures beige clair avec un voile gris. Petites et moyennes couvertures jaunes voilées de beige.
Croupion	Jaune.
Queue	Deux premiers tiers des rectrices jaunes et dernier tiers beige sans liseré sauf pour les deux rectrices médianes qui n'ont pas de jaune.
Yeux	Rouges.
Bec	Couleur chair.
Pattes, doigts, ongles	Couleur chair.



*Verdier d'Europe mâle*  
*~ Mutation lutino ~*

Taille du corps : 13/15 cm

Zones du plumage	Couleur
Tête, gorge, dos, poitrine, flancs	Jaunes.
Ventre	Blanc jaunâtre.
Ailes	Grandes rémiges jaunes avec vexille externe jaune doré et liseré beige très clair à l'extrémité. Rémiges secondaires jaunes.
Couvertures	Jaunes.
Croupion	Jaune doré.
Queue	Jaune avec liseré externe jaune doré.
Yeux	Rouges.
Bec	Couleur chair.
Pattes, doigts, ongles	Couleur chair.



*Verdier d'Europe femelle*  
*~ Mutation lutino ~*

Taille du corps : 13/15 cm

Zones du plumage	Couleur
Tête, gorge, dos, poitrine, flancs	Blanc jaunâtre.
Ventre	Blanchâtre.
Ailes	Grandes rémiges blanchâtres avec vexille externe jaune. Rémiges secondaires blanchâtres. Epauls jaunes.
Couvertures	Grandes couvertures jaune blanchâtre. Petites et moyennes couvertures blanchâtres.
Croupion	Jaune.
Queue	Blanchâtre avec petit liseré jaune.
Yeux	Rouges.
Bec	Couleur chair.
Pattes, doigts, ongles	Couleur chair.



## *Verdier d'Europe* ~ Mutation pastel ~

Taille du corps : 13/15 cm

Zones du plumage	Couleur
Tête	Gris vert avec les moustaches et les joues grisâtres.
Dos, poitrine, flancs	Vert olive avec des reflets gris.
Epaules, gorge	Jaune verdâtre.
Ventre	Gris blanchâtre.
Ailes	Rémiges primaires gris foncé avec vexille externe jaune vif. Rémiges secondaires gris clair avec un liseré gris foncé.
Croupion	Vert olive
Queue	Jaune à la base avec l'extrémité gris clair lavée de jaune. un liseré gris plus foncé entoure les rectrices.
Yeux	Brun foncé.
Bec	Couleur chair, flammé de brun clair.
Pattes, doigts	Couleur chair.
Ongles	Couleur corne.

Dimorphisme sexuel : mêmes caractéristiques que les mâles mais le pigment est plus foncé. Les liserés jaunes des rémiges et des rectrices sont moins larges et plus ternes. Très léger dessin dorsal visible.

Remarque : il faut tenir compte qu'il existe des spécimens schimmel et intensifs. Cette différence est bien marquée.



Photo KBOF

***Verdier d'Europe mâle***  
***~ Mutation agate pastel (dénomination provisoire en étude)~***

**Taille du corps** : 13/15 cm

Photo J.M. Egtorff

Zones du plumage	Couleur
Couronne, joues, moustaches	Gris clair. Le reste de la tête est vert jaunâtre.
Dos	Vert olive. Voile gris clair bien régulier.
Gorge, poitrine, flancs, croupion	Jaune verdâtre. Poitrine et flancs avec un léger voile gris.
Ventre	Jaune verdâtre plus clair que la poitrine.
Ailes	Rémiges primaires grises, et jaunes le long du vexille externe avec un liseré gris clair à l'extrémité. Rémiges secondaires grises, avec un large liseré gris très clair.
Couvertures	Grandes couvertures gris argenté clair. Petites et moyennes couvertures jaune verdâtre.
Queue	Deux premiers tiers des rectrices jaunes et dernier tiers gris avec un liseré gris clair sauf pour les deux rectrices médianes qui n'ont pas de jaune.
Yeux	Noirs.
Bec	Couleur chair.
Pattes, doigts	Couleur chair.
Ongles	Couleur corne.



***Verdier d'Europe femelle***  
***~ Mutation agate pastel (dénomination provisoire en étude) ~***

**Taille du corps** : 13/15 cm

Zones du plumage	Couleur
Couronne	Jaune verdâtre avec des stries gris clair.
Joues	Jaune verdâtre lavées de gris clair.
Moustaches	Gris clair.
Dos	Gris avec un dessin strié de gris clair bien visible.
Gorge, poitrine	Jaune verdâtre pâle avec un voile gris argenté léger.
Flancs	Jaune verdâtre pâle avec un voile gris clair et un léger dessin.
Croupion	Jaune verdâtre.
Ventre	Légèrement plus clair que la poitrine.
Ailes	Rémiges primaires grises, et jaunes le long du vexille externe avec un liseré gris clair à l'extrémité. Rémiges secondaires grises, avec un large liseré gris très clair.
Couvertures	Grandes couvertures gris argenté clair. Petites et moyennes couvertures jaune verdâtre.
Queue	Deux premiers tiers des rectrices jaunes et dernier tiers gris avec un liseré gris clair sauf pour les deux rectrices médianes qui n'ont pas de jaune.
Yeux	Noirs.
Bec, pattes, doigts	Couleur chair.
Ongles	Couleur corne.

Photo Philippe ROCHER



***Verdier d'Europe***  
 ~ ***Mutation isabelle pastel (dénomination provisoire en étude)*** ~

Taille du corps : 13/15 cm

Zones du plumage	Couleur
Front, lorums, menton, contours des yeux	Masque jaune
Région auriculaire, vertex	Jaunes avec un léger voile beige clair jusque dans la nuque.
Dos	Jaunes avec un léger voile beige.
Poitrine, flancs, croupion	Jaunes.
Ventre	Blanc sale.
Ailes	Rémiges primaires beiges avec un liseré jaune. Rémiges secondaires beige clair avec un liseré jaune. Couvertures jaunes.
Queue	Beige avec les deux premiers tiers jaunes.
Yeux	Isabelle.
Pattes, doigts, ongles, bec	Couleur chair.



Dimorphisme sexuel : mêmes caractéristiques que les mâles mais le pigment est moins lumineux. Les liserés jaunes des rémiges et des rectrices sont moins larges et plus ternes.

ATTENTION : Risque de confusion avec la variété isabelle satiné

***Verdier d'Europe***  
***~ Mutation brun pastel (dénomination provisoire en étude) ~***

Taille du corps : 13/15 cm

Zones du plumage	Couleur
Tête	Brun très clair
Région auriculaire, vertex, front, nuque	Brun clair. Masque et sourcils jaune clair chez le mâle
Dos	Jaune clair voilé de brun léger
Gorge, poitrine, flancs	-idem-
Ventre	Beige crème
Ailes	Brun clair avec miroir jaune
Couvertures	Jaune voilé de brun clair
Croupion	Jaune
Queue	Brun clair liseré jaune
Yeux	Brun
Ongles, pattes, doigts, bec	Couleur chair




Dimorphisme sexuel : mêmes caractéristiques que les mâles mais le pigment est plus foncé. Les liserés jaunes des rémiges et des rectrices sont moins larges et plus ternes.

**ATTENTION : Risque de confusion avec la variété isabelle.**

# Linotte mélodieuse

(*Carduelis cannabina*)

Mâle plumage nuptial



Femelle



***Linotte mélodieuse mâle (Carduelis cannabina)***  
**~ Phénotype sauvage ~**

**Taille du corps : 14cm**

Zone du plumage	Couleur
<b>BEC</b>	Gris-brun clair en hiver avec la mandibule inférieure plus claire.
<b>YEUX</b>	Brun foncé.
<b>TETE</b>	Front et couronne : brun cannelle avec sourcils crème et une tache crème sur chaque joue.
<b>DOS</b>	Brun marron.
<b>EPAULES</b>	Brun marron.
<b>POITRINE</b>	De couleur beige striée de brun noir.
<b>GORGE et MENTON</b>	Blanchâtre avec stries brun foncé
<b>FLANCS</b>	Brun clair avec des fines stries brun foncé.
<b>VENTRE</b>	Blanchâtre.
<b>AILES</b>	Grandes rémiges primaires noires avec un liseré externe blanc. Rémiges secondaires : brun marron.
<b>CROUPION</b>	Cannelle clair, légèrement strié de raies interrompues.
<b>QUEUE</b>	Rectrices noires avec un liseré blanc le long du vexille externe.
<b>PATTES et DOIGTS</b>	Brunâtre.
<b>ONGLES</b>	Noir.
<b>BEC</b>	Gris-brun clair en hiver avec la mandibule inférieure plus claire.



*Linotte mélodieuse femelle (Carduelis cannabina)*  
~ *Phénotype sauvage* ~

Taille du corps : 14cm

Mêmes caractéristiques que le mâle mais la poitrine, la tête et les flancs sont plus striés que chez le mâle.



# Linotte à bec jaune

(*Carduelis flavirostris*)



*Linotte à bec jaune (Carduelis flavirostris)*  
~ *Phénotype sauvage* ~

Taille du corps : 14cm

Zone du plumage	Couleur
<b>BEC</b>	Petit, jaune avec pointe noirâtre.
<b>YEUX</b>	Brun foncé.
<b>TETE</b>	Petite et ronde. Front, couronne, joues et nuque : brun ocre, striés de noir. Lorums : de couleur rouille.
<b>DOS</b>	Brun ocre, strié de brun noirâtre.
<b>EPAULES</b>	Jaune ocre.
<b>POITRINE</b>	Brun ocre avec des stries brun foncé, partant du milieu de la poitrine vers les flancs.
<b>GORGE</b>	Brun ocre, légèrement strié.
<b>FLANCS</b>	Brun ocre avec des stries brun foncé et bien régulières.
<b>VENTRE</b>	Blanc sale.
<b>AILES</b>	Brun noirâtre avec un étroit liseré blanc le long du vexille externe des rémiges
<b>CROUPION</b>	Rose carmin dans la nature mais ocre roux n'est pas fautif.
<b>QUEUE</b>	Brun noirâtre avec liseré blanchâtre le long du vexille externe, l'extrémité de la queue fourchue.
<b>PATTES et DOIGTS</b>	Brun noirâtre.
<b>ONGLES</b>	Noir.



Photo FOI

La femelle ressemble au mâle mais est de couleur plus pâle. Le croupion n'est jamais carmin mais brun gris léger avec des stries noires et étroites.

# *Genre Pyrrhula*

# Bouvreuil pivoine

(*Pyrrhula pyrrhula europaea*)

Male



Femelle



Taille 15cm

# Bouvreuil pivoine (ponceau)

(*pyrrhula pyrrhula pyrrhula*)



**Taille 18 cm,**

- moins coloré qu'europaea
- Sans trace de rouge sur le dos

# Bouvreuil pivoine (ibère)

(*pyrrhula pyrrhula iberiae*)



Taille 13,5 cm,

- plus coloré que les deux autres sous-espèces
- peut présenter des traces rouges sur le manteau

# Bouvreuil pivoine (ibère)

*(pyrrhula pyrrhula iberiae)*



## *Bouvreuil pivoine (Pyrrhula pyrrhula)* ~ Phénotype sauvage ~

Taille du corps : 13,5 - 18 cm

Zones du plumage	Couleur
Tête	Calotte et contours du bec noirs. Nuque courte et bien remplie.
Dos, épaules	Gris bleuâtre. Sans trace de rouge, sauf <i>spp iberiae</i>
Gorge, poitrine, flancs	Couleur rouge régulièrement répartie et délimitée par la calotte noire en-dessous des yeux.
Abdomen, sous-caudales	Blancs.
Rémiges	Rémiges primaires et secondaires noires à reflets bleuâtres. Bande alaire gris blanc qui part du bord externe de l'aile et s'élargit vers le dos. Deux petites plumules rouges garnissent l'extrémité des rémiges tertiaires.
Croupion	Blanc.
Queue	Noir brillant.
Yeux	Noirs.
Bec	Noir, court et très bombé avec extrémité de la mandibule supérieure légèrement courbée.
Pattes, doigts, ongles	Noirs.



Photo Philippe ROCHER




Photo Philippe ROCHER

Dimorphisme sexuel : mêmes caractéristiques que le mâle avec les couleurs plus ternes.

De plus, chez la femelle, le dos est gris brunâtre et la poitrine est gris brunâtre teinté de beige.

*Bouvreuil pivoine*  
~ Mutation pastel ~

Taille du corps : 13,5 - 18 cm

Zones du plumage	Couleur
Tête	Calotte brun noirâtre. Joues de couleur rosée.
Dos, épaules	Gris pastel (gris beige).
Poitrine	Rose.
Abdomen, sous-caudales	Blancs.
Rémiges	Rémiges primaires et secondaires gris foncé. Barre alaire gris beige clair. Taches roses sur des rémiges tertiaires.
Croupion	Blanc.
Queue	Gris foncé avec sus-caudales plus claires.
Yeux	Brun foncé.
Bec	Brun noirâtre.
Pattes, doigts	Brun foncé.
Ongles	Foncés.

Dimorphisme sexuel : mêmes caractéristiques que le mâle avec les couleurs du manteau et de la poitrine beige clair.



## *Bouvreuil pivoine mâle Mutation brun ~*

Taille du corps : 13,5 - 18 cm

Zones du plumage	Couleur
Tête	Calotte brun très foncé tirant sur le noir.
Dos	Gris clair avec reflets beiges.
Epaules	Gris clair.
Poitrine, gorge, flancs	Roses.
Ventre	Tirant sur le blanc.
Rémiges	Rémiges primaires brunes. Rémiges secondaires brun très foncé tirant sur le noir. Barre ailaire gris clair.
Couvertures	Brun très foncé tirant sur le noir.
Croupion	Blanc.
Queue	Brun très foncé avec reflets métalliques.
Yeux	Brun foncé.
Bec	Mandibule supérieure brune. Mandibule inférieure couleur chair.
Pattes, doigts	Brun très clair.
Ongles	Bruns.

Remarque : les rectrices ont leur partie externe brun très foncé à reflets métalliques et leur partie interne brune, sauf pour les deux médianes entièrement brun foncé à reflets métalliques. Vue de dessous, la queue apparaît brune.



Photo Philippe ROCHER

*Bouvreuil pivoine femelle*  
~ *Mutation brun* ~

Taille du corps : 13,5 - 18 cm

Zones du plumage	Couleur
Tête	Calotte brun foncé tirant sur le noir. Joues beige brun.
Dos	Beige brun lavé de gris.
Epaules	Beige brun lavé de gris.
Poitrine, gorge, flancs	Beige brun très uniforme.
Ventre	Clair, tirant sur le blanc.
Rémiges	Rémiges primaires brunes. Rémiges secondaires brun très foncé tirant sur le noir. Barre alaire gris beige.
Couvertures	Brun très foncé tirant sur le noir.
Croupion	Blanc.
Queue	Brun très foncé avec reflets métalliques.
Yeux	Brun foncé.
Bec	Mandibule supérieure brune. Mandibule inférieure couleur chair.
Pattes, doigts	Brun très clair.
Ongles	Bruns.



Photo Driessmans

*Bouvreuil pivoine mâle*  
*~ Mutation brun pastel ~*

Taille du corps : 13,5 - 18 cm

Zones du plumage	Couleur
Front, calotte, nuque, lorums, menton	Brun noisette chaud. léger voile rouge au vertex toléré
Dos	Gris beige très clair.
Poitrine, gorge, flancs	Rouge rose.
Ventre	Région anale blanche.
Rémiges	Rémiges primaires beige clair. Rémiges secondaires et tertiaires brun beige. Bande alaire claire.
Croupion	Blanc.
Queue	Brun beige.
Yeux	Brun foncé.
Bec	Couleur chair.
Pattes, doigts	Couleur chair.
Ongles	Bruns.



*Bouvreuil pivoine femelle*  
~ *Mutation brun pastel* ~

Taille du corps : 13,5 - 18 cm

Zones du plumage	Couleur
Front, calotte, nuque, lorums, menton	Brun noisette chaud.
Dos	Beige.
Poitrine, gorge, flancs	Beiges, légèrement teintés de lilas.
Ventre	Région anale blanche.
Rémiges	Rémiges primaires beige clair. Rémiges secondaires et tertiaires brun beige. Bande alaire claire.
Croupion	Blanc.
Queue	Brun beige.
Yeux	Brun foncé.
Bec	Couleur chair.
Pattes, doigts	Couleur chair.
Ongles	Bruns.



***Bouvreuil pivoine***  
***~ Mutation blanc ~***

**Taille du corps** : 13,5 - 18 cm

Zones du plumage	Couleur
Tête	blanche
Dos, épaules	blanc.
Gorge, poitrine, flancs	Chez le mâle rose saumon clair Chez la femelle blanche.
Abdomen, sous-caudales	Blancs.
Ailes	rémyges blanches deux couvertures rose saumon
Croupion	Blanc.
Queue	blanche.
Yeux	Noirs.
Bec	Couleur chair
Ventre	blanc
Pattes, doigts,	Couleur chair
ongles	blancs.



Photo RBOF



DEFAUTS ; traces de couleur sur le dos

## *Bouvreuil pivoine* ~ Mutation jaune ~

Taille du corps : 13,5 - 18 cm

Zones du plumage	Couleur
Calotte et tour du bec	Noirs jusqu'en dessous des yeux.
Dos, épaules	Gris bleuâtre.
Poitrine, gorge, flancs	Couleur jaune verdâtre régulièrement répartie.
Bas de l'abdomen, sous-caudales, croupion	Blancs.
Ailes	Rémiges primaires et secondaires noires à reflets bleuâtres. Bande alaire gris blanc à partir du bord externe de l'aile en s'élargissant vers le dos. Deux plumules rouges à l'extrémité des rémiges tertiaires.
Queue	Rectrices noir brillant.
Yeux	Noirs.
Bec	Noir, court et très bombé avec l'extrémité de la mandibule supérieure légèrement courbée.
Ongles, pattes, doigts	Noirs.



Photo Orismands

Dimorphisme sexuel : la femelle a les mêmes caractéristiques que le mâle mais les couleurs sont plus ternes.

Remarque : cette mutation a été combinée aux autres variétés existantes.

*Bouvreuil pivoine*  
~ *Mutation brun pastel jaune* ~

Même caractéristique que le  
Brun pastel mais  
Avec la face ventrale jaune



Photo Orizsmans

*Bouvreuil pivoine mâle*  
*~ Mutation topaze ~*

Taille du corps : 13,5 - 18 cm

zone du plumage	Couleur
bec	Couleur corne, court et massif
yeux	Rouge foncé.
tête	Calotte : gris foncé avec un minimum de rouge dans la calotte. Joues : orange rouge
dos	Gris bleu clair sans voile rouge
poitrine, flancs, gorge	Orange rouge.
ventre	Orange rouge, blanc dans la partie inférieure
ailes	Gris foncé, bien réparti avec une barre alaire plus claire partant du bord de l'aile. Flamme sur la dernière rémige tertiaire
queue et croupion	Gris foncé en harmonie avec les rémiges Croupion blanc
pattes & doigts	Couleur chair
ongles	corne



Les variétés pastel topaze et brun topaze sont en étude

***Bouvreuil pivoine femelle***  
***~ Mutation topaze ~***

Taille du corps : 13,5 - 18 cm

Zone du plumage	Couleur
<b>BEC</b>	Couleur corne, court et massif
<b>YEUX</b>	Rouge foncé.
<b>TETE</b>	Calotte : gris foncé. Joues : gris brun clair
<b>DOS</b>	Gris-brun foncé sans voile rouge.
<b>POITRINE</b>	Gris brun clair.
<b>FLANCS</b>	De même couleur que la poitrine
<b>VENTRE</b>	Gris brun clair, blanc dans la partie inférieure
<b>AILES</b>	Gris foncé, bien réparti avec une barre alaire plus claire partant du bord de l'aile. Flamme sur la dernière rémige tertiaire
<b>QUEUE &amp; CROUPION</b>	Gris en harmonie avec les rémiges Croupion blanc
<b>PATTES &amp; DOIGTS</b>	Couleur chair
<b>ONGLES</b>	corne



Photo RBOF

Genre *fringilla*

# Pinson des arbres

(*Fringilla coelebs*)

Mâle



***Pinson des arbres mâle (Fringilla coelebs)***  
**~ Phénotype sauvage ~**

Taille du corps : 14 cm

Zones du plumage	Couleur
Front	Noir.
Couronne, occiput, nuque	Gris bleuté.
Joues, lorums, menton, sourcils, région auriculaires, gorge, poitrine, flancs	Passant du rose brun ou rouge brun.
Dos	Brun marron.
Epaules	Gris bleuté.
Ventre	Région anale blanche.
Rémiges	Primaires brun noir. Secondaires brun noir avec un liseré jaunâtre à la partie inférieure des rémiges. Sus-alaires et barre alaire blanches avec petit miroir blanc.
Croupion	Vert olive teinté de jaune.
Queue	Rectrices brun noirâtre étroitement liserées de vert le long du vexille externe. Rectrices externes avec grande tache blanche à leur partie inférieure.
Yeux	Brun foncé.
Bec	Bleu acier en été, brun gris avec l'extrémité plus foncée en hiver.
Pattes, doigts	Brun clair.
Ongles	Noirâtres.



Photo Philippe ROCHER

***Pinson des arbres femelle (Fringilla coelebs)***  
**~ Phénotype sauvage ~**

Taille du corps : 14 cm

Zones du plumage	Couleur
Tête, dos, poitrine	Gris brun.
Gorge	Gris brun sans taches plus claires.
Epaules	Brun beige.
Flancs	Gris brun sans être délavés.
Ventre	Région anale blanc sale.
Rémiges	Comme le mâle mais plus brunes. La barre alaire est aussi moins blanche.
Croupion	Vert lavé de jaunâtre.
Queue	Comme le mâle mais plus brune.
Yeux	Brun foncé.
Bec	Gris brun.
Pattes, doigts	Brun clair.
Ongles	Noirâtres.



*Pinson des arbres mâle*  
*~ Mutation brun ~*

Taille du corps : 14 cm


Zones du plumage	Couleur
Tête	Brun avec la bande frontale plus foncée.
Gorge, poitrine	Brun avec un voile lie de vin.
Dos	Brun.
Flancs	Brun avec un voile lie de vin.
Ventre	Brun clair.
Rémiges	Rémiges primaires brunes avec un miroir blanc. Rémiges secondaires brunes.
Couvertures	Grandes couvertures brunes avec une barre alaire crème. Couvertures moyennes brunes avec barre scapulaire blanche. Petites couvertures brunes.
Croupion	Brun.
Queue	Brun avec dessin blanc sous la queue.
Yeux	Brun foncé.
Bec	Brun clair.
Pattes, doigts	Couleur chair.
Ongles	Couleur chair.



*Pinson des arbres femelle*  
*~ Mutation brun ~*

Taille du corps : 14 cm

Zones du plumage	Couleur
Tête, dos, poitrine	Brun chaud.
Gorge	Brun chaud.
Flancs	Brun chaud.
Ventre	Région anale blanc crème.
Rémiges	Rémiges primaires brun chaud avec un miroir blanc. Rémiges secondaires brun chaud.
Couvertures	Grandes couvertures brun chaud avec un miroir blanc. Couvertures moyennes brun chaud avec barre scapulaire blanche. Petites couvertures brun chaud.
Croupion	Brun chaud.
Queue	Brun chaud avec dessin blanc sous la queue.
Yeux	Brun foncé.
Bec	Brun clair.
Pattes, doigts	Couleur chair.
Ongles	Couleur chair.



## *Pinson des arbres mâle* ~ Mutation agate ~

Taille du corps : 14 cm

Zones du plumage	Couleur
Front	Noir.
Couronne, occiput, nuque	Gris bleuté.
Joues, lorums, menton, sourcils, région auriculaires, gorge, poitrine, flancs	Rose brun.
Dos	Gris brunâtre.
Ventre	Région anale blanche.
Ailes	Rémiges primaires noires. Rémiges secondaires noires avec un liseré jaunâtre à leur partie inférieure. Sus- alaires (épaules) blanches. Barre alaire blanche et petit miroir blanc.
Croupion	Vert olive teinté de jaune.
Queue	Rectrices noires étroitement liserées de vert le long du vexille externe. Les rectrices externes portent une grande tache blanche à leur partie inférieure.
Yeux	Brun foncé.
Bec	Bleu acier en été, gris avec l'extrémité plus foncée en hiver.
Pattes, doigts	Couleur chair.
Ongles	Foncés.



Photo KBOF

*Pinson des arbres femelle*  
*~ Mutation agate ~*

Taille du corps : 14 cm

Zones du plumage	Couleur
Tête, dos	Gris brun clair, avec deux raies gris foncé sur le vertex et descendant dans la nuque.
Gorge, poitrine	Gris clair.
Dos, épaules	Gris brun clair.
Flancs	Gris brun clair.
Ventre	Région anale gris blanc sale.
Ailes	Rémiges primaires noires. Rémiges secondaires noires avec un liseré jaunâtre à leur partie inférieure. Sus- alaires (épaules) blanches. Barre alaire moins blanche que chez le mâle et petit miroir blanc.
Croupion	Vert lavé de jaunâtre.
Queue	Rectrices noires étroitement liserées de vert le long du vexille externe. Les rectrices externes portent une grande tache blanche à leur partie inférieure.
Yeux	Brun foncé.
Bec	Brun clair légèrement flammé de gris.
Pattes, doigts	Couleur chair.
Ongles	Foncés.



Photo RBOF

***Pinson des arbres mâle***  
***~ Mutation opale ~***

**Taille du corps** : 14 cm

Zones du plumage	Couleur
Front	Noir.
Couronne, occiput, nuque	Gris foncé bleuté.
Joues, lorums, menton, sourcils, région auriculaires	Couleur jaunâtre, voilée de chamois
Epaules	Gris foncé bleuté.
Gorge, poitrine, flancs	Couleur lie de vin très clair avec un voile gris clair bleuté.
Dos, croupion	Jaune verdâtre. Dos avec des reflets bleutés.
Ventre	Région anale sale blanc.
Ailes	Rémiges primaires gris bleu. Rémiges secondaires gris bleu avec un liseré jaunâtre à leur partie inférieure. Sus-alaires (épaules) blanches. Barre alaire jaune verdâtre et petit miroir blanc.
Queue	Rectrices gris bleuté étroitement liserées de jaune verdâtre le long du vexille externe. Les rectrices externes portent une grande tache blanche à leur partie inférieure.
Yeux	Brun foncé.
Bec	Gris foncé bleuté en été, gris foncé en hiver.
Pattes, doigts	Couleur chair foncé.
Ongles	Foncés.



Photo A. CUPIDO

*Pinson des arbres femelle*  
*~ Mutation opale ~*

Taille du corps : 14 cm

Zones du plumage	Couleur
Tête	Gris clair bleuté avec deux raies plus foncées sur le vertex et descendant dans la nuque.
Dos	Jaune verdâtre avec un voile bleuté
Epaules	Gris clair bleuté.
Gorge, poitrine, flancs	Gris clair lavé de jaunâtre.
Ventre	Région anale gris blanc sale.
Ailes	Comme la mâle mais d'un gris bleuté plus clair.
Croupion	Jaune verdâtre.
Queue	Comme la mâle mais d'un gris bleuté plus clair.
Yeux	Brun foncé.
Bec	Couleur chair foncé légèrement flammé de gris.
Pattes, doigts	Couleur chair foncé.
Ongles	Foncés.



Photo UOF

***Pinson des arbres***  
***~ Mutation brun opale ~***

Taille du corps : 14 cm

Zones du plumage	Couleur
Tête, Dos, Epaules	Le plumage est presque totalement dépourvu de pigmentation en eumélanine. Il subsiste un léger voile de phaeomélanine sur le dos, les rémiges et les rectrices.
Gorge, poitrine, flancs	Le dos et le poitrail et le croupion sont jaune crème chez le mâle, beige très clair chez la femelle
Ventre. Ailes, Croupion	
Queue, Yeux	Brun
Pattes, doigts	Couleur chair
Ongles	-idem-



photo UOF

# Pinson du Nord

(*Fringilla montifringilla*)

Mâle plumage hivernal



plumage nuptial



## *Pinson du nord mâle (Fringilla montifringilla)* ~ Phénotype sauvage ~

Taille du corps : 14 cm

Zones du plumage	Couleur
<b>BEC</b>	Jaunâtre avec pointe noire.
<b>YEUX</b>	Brun foncé.
<b>TETE</b>	Front, vertex, nuque, joues et région auriculaire : d'une couleur noirâtre, liserée de brun-gris. Cette couleur est uniformément répartie. En été, la tête est complètement noire
<b>DOS et CROUPION</b>	dos : noir écaillé de gris- brun (noir en été). Croupion : Blanc
<b>GORGE</b>	Brun noisette.
<b>POITRINE</b>	De couleur brun noisette, sans voile, et uniformément répartie sur l'ensemble de la poitrine. La ligne qui sépare le brun de la poitrine et le blanc du ventre doit être régulière et légèrement arrondie.
<b>FLANCS</b>	La couleur des flancs est d'un brun clair avec de préférence deux rangées de spots noirs, le plus uniformément répartis. La première rangée sera souvent cachée par l'aile. Les spots des mâles sont plus larges et ont tendance à se grouper plus fort que chez la femelle.
<b>VENTRE</b>	Blanc pur.
<b>AILES</b>	Les scapulaires sont d'un brun noisette et sont bordées d'un étroit liseré clair. La barre alaire a la même couleur que la poitrine (brun noisette). Un petit miroir blanc est obligatoire. Les rémiges primaires sont d'un noir brunâtre foncé Les rémiges secondaires sont noir brunâtre avec le vexille externe brun clair..
<b>QUEUE</b>	Les rectrices sont noires. Les deux rectrices externes ont une grande tache blanche longitudinale sur le côté inférieur. Les sus-caudales médianes sont noirâtres avec un liseré brun à l'extrémité. L'extrémité de la queue est fourchue.
<b>PATTES et DOIGTS</b>	Chair foncé
<b>ONGLES</b>	noir



Plumage nuptial



Plumage hivernal

Photos Philippe ROCHER

***Pinson du nord femelle (Fringilla montifringilla)***  
***~ Phénotype sauvage ~***

<u>Taille du corps :</u>	14cm
<b>Zone du plumage</b>	<b>couleur</b>
<b>TETE</b>	Comme chez le mâle, mais les teintes sont brun gris dans l'ensemble. Les deux raies brunâtres partent du haut de la tête et descendent vers la nuque.
<b>DOS</b>	Dessin écaillé typique de couleur gris brun.
<b>AILES</b>	Comme le mâle, mais d'une couleur plus terne.
<b>FLANCS</b>	Les spots doivent être bien répartis et réguliers sur deux rangées et sur un fond brun clair.
<b>POITRINE</b>	La couleur ne peut pas être délavée, mais d'un brun noisette, qui sera
<b>VENTRE</b>	Blanc grisâtre.
<b>QUEUE</b>	Brun foncé et fourchue.
<b>TETE</b>	Comme chez le mâle, mais les teintes sont brun gris dans l'ensemble. Les deux raies brunâtres partent du haut de la tête et descendent vers la nuque.
<b>DOS</b>	Dessin écaillé typique de couleur gris brun..



# Genre *serinus*

# Serin cini

(*Serinus serinus*)

Mâle



Femelle



***Serin cini mâle (Serinus serinus)***  
**~ Phénotype sauvage ~**

**Taille du corps : 11cm**

Zone du plumage	Couleur
<b>BEC</b>	Petit, court, conique et gris foncé.
<b>YEUX</b>	Brun foncé.
<b>TETE</b>	Jaune vif partant de la base du bec jusqu'aux yeux passant par du gris vert, strié de brun gris sur la nuque et les joues. Certains vieux mâles ont une tache jaune sur les joues
<b>COU</b>	Demi-collier jaunâtre.
<b>DOS</b>	Gris brunâtre strié de noir.
<b>EPAULES</b>	Gris brunâtre.
<b>POITRINE</b>	Jaune vif.
<b>GORGE</b>	Jaune vif.
<b>FLANCS</b>	Passant du jaune clair dans la région des épaules au gris clair près du
<b>VENTRE</b>	Gris clair.
<b>AILES</b>	Brun noir avec un liseré jaune verdâtre au bord extérieur des rémiges.
<b>CROUPION</b>	Jaune vif.
<b>QUEUE</b>	Brun noir
<b>PATTES et DOIGTS</b>	Couleur chair
<b>ONGLES</b>	Brun foncé



*Serinus cini femelle (Serinus serinus)*  
~ *Phénotype sauvage* ~

Taille du corps : 11cm

La femelle a les mêmes caractéristiques que le mâle, mais la couleur jaune vif du mâle est plus atténuée chez la femelle

La femelle est plus striée sur la gorge, la poitrine et les flancs que la mâle. Les stries sont plus larges et plus distinctes




# Venturon montagnard

(*Serinus cintrinella*)

Mâle



Femelle



*Venturon montanard mâle (Serinus cintrinella)*  
~ *Phénotype sauvage* ~

Taille du corps : 12cm

Zone du plumage	Couleur
<b>BEC</b>	Pointu, fin, gris-noirâtre.
<b>YEUX</b>	Brun-noir.
<b>TETE</b>	Fine, dessus et côtés de la tête, nuque et côtés du cou gris-bleuté uni. Masque circulaire : jaune-vert lumineux couvrant le front, la région oculaire, le bas des joues et le menton
<b>DOS</b>	Vert-olive, marqué de stries gris-brun légères et assez floues.
<b>GORGE – POITRINE</b>	Jaune-vert, lumineux comme le masque.
<b>FLANCS</b>	Verts, lavés de gris.
<b>VENTRE</b>	Zone anale et sous-caudales : jaunes.
<b>AILES</b>	Rémiges : noir-verdâtre avec liseré externe gris-vert. Couvertures : noirâtres avec large liseré verdâtre, dessinant une double barre alaire.
<b>CROUPE</b>	Jaune-vert uni.
<b>QUEUE</b>	Rectrices : noir-verdâtre, liserées de gris-vert.
<b>PATTES et DOIGTS</b>	Gris-brun.
<b>ONGLES</b>	Brun-noir.
<b>FORME GENERALE</b>	Fine et élégante.



*Venturon montagnard femelle (Serinus cintrinella)*  
~ *Phénotype sauvage* ~

Taille du corps : 12cm

La femelle a la même livrée que le mâle avec des teintes un peu plus ternes, un masque moins étendu et des stries un peu plus marquées.

Le gris-bleuté n'est pas interrompu à la gorge



*Venturon montagnard corse (Serinus cintrinella corsica)*  
~ *Phénotype sauvage* ~

Taille du corps : 12cm

Chez l'espèce *Serinus cintrinella corsicana* :

- le manteau est brun-chaud et la poitrine vert-jaune plus vif.
- La femelle est plus terne



# Genre *loxia*

*Remarque :*

- *En première année la couleur des jeunes mâles peut être moins intensive*


# Bec croisé des sapins

(*Loxia curvirostra*)

Mâle



Femelle



***Bec croisé des sapins mâle (Loxia curvirostra)***  
**~ Phénotype sauvage ~**

Taille du corps : 16.5cm

Zone du plumage	Couleur
<b>BEC</b>	Brun gris foncé et croisé complètement. Racine de la mandibule inférieure plus claire. Les mandibules peuvent croisées d'un côté ou l'autre du bec.
<b>YEUX</b>	Brun foncé.
<b>TETE</b>	Front, vertex et nuque : sont rouge plus ou moins intensif. Certains bec-croisé possèdent un dessin écaillé sur le vertex alors que d'autres ont le vertex de couleur uniforme (les deux sont valables). Dessin en forme de fer à cheval brunâtre sur les joues. Lorums et régions auriculaires : brun foncé nuancé de rose. Bas de la nuque moins rouge et plutôt brunâtre.
<b>DOS</b>	Manteau et scapulaires : moins rouge que la poitrine mais plutôt rouge brunâtre.
<b>POITRINE</b>	Brun rougeâtre.
<b>FLANCS</b>	Brun rougeâtre.
<b>VENTRE</b>	Blanc grisâtre ainsi que la région anale.
<b>AILES</b>	Rémiges primaires : de couleur noir brunâtre avec un étroit liseré rouge brunâtre le long du vexille externe. Le bout des rémiges possède un bord grisâtre. Couvertures sus alaires de couleur brun foncé. Les petites et les moyennes couvertures sus alaires ont un bord rougeâtre.
<b>QUEUE</b>	Rectrices : de couleur noir brunâtre avec un étroit liseré rougeâtre ou Sous-caudale : grisâtre avec un dessin écaillé (forme de V).
<b>PATTES et DOIGTS</b>	brun foncé.
<b>ONGLES</b>	Noir.



Photo UOF

*Bec croisé des sapins femelle (Loxia curvirostra)*  
~ *Phénotype sauvage* ~

Taille du corps : 16.5cm

La femelle possède les mêmes marques que le mâle, mais la couleur de presque toutes les parties du corps est vert olive grisâtre.

La femelle est plus striée de brun dans l'ensemble que le mâle, notamment sur la tête, la poitrine, le dos et les flancs. Le croupion est jaune verdâtre.

La femelle possède un dessin frontal typiquement gris clair.



photo UOF

# Bec croisé bifascié

*(Loxia leucoptera bifasciata)*



***Bec croisé bifascié mâle (Loxia leucoptera)***  
**~ Phénotype sauvage ~**

Taille du corps : 14.5cm

Zone du plumage	Couleur
<b>BEC</b>	Couleur corne, assez long. Les mandibules se croisent à l'extrémité de façon très distincte
<b>YEUX</b>	Noir.
<b>TETE</b>	Entièrement rouge carmin, légèrement écaillée avec la zone loreale et le dessin des joues gris. Le sommet du crâne et la nuque portent une légère suffusion grise
<b>DOS</b>	Rouge carmin, voilé de gris et faiblement écaillé.
<b>GORGE et POITRINE</b>	Rouge carmin.
<b>FLANCS</b>	Rouge carmin indistinctement lavé de gris.
<b>VENTRE</b>	Rouge carmin, se dégradant en blanc sale sur la zone anale.
<b>AILES</b>	Rémiges : noires, liserées de blanc. Les rémiges secondaires externes sont plus largement liserées, surtout à leur extrémité. Couvertures : noires avec une nette bordure blanche, qui dessine une qui dessine une double barre alaire très nette.
<b>CROUPION</b>	Rouge carmin, légèrement écaillé sur son pourtour.
<b>SOUS-CAUDALE</b>	Porte un dessin écaillé typique, qui doit être régulier.
<b>QUEUE</b>	Assez courte, légèrement échancrée. Rectrices : noires, très finement liserées de grisâtre
<b>PATTES</b>	Gris brun. Robustes et assez courtes.
<b>DOIGTS</b>	Gris brun.
<b>ONGLES</b>	Couleur corne.



Photo Philippe ROCHER

*Bec croisé bifascié femelle (Loxia leucoptera)*  
~ *Phénotype sauvage* ~

Taille du corps : 14.5cm

La femelle possède les mêmes marques que le mâle, mais la couleur de presque toutes les parties du corps est vert olive grisâtre.

La femelle est plus striée de brun dans l'ensemble que le mâle, notamment sur la tête, la poitrine, le dos et les flancs. Le croupion est jaune verdâtre.

La femelle possède un dessin frontal typiquement gris clair.



# Bec croisé perroquet

(*Loxia pytyopsittacus*)

Mâle



*Loxia scotica*  
Mâle



***Bec croisé perroquet mâle (Loxia pytyopsittacus)***  
**~ Phénotype sauvage ~**

Taille du corps : 17cm

Zone du plumage	Couleur
<b>BEC</b>	Couleur corne, puissant, de forme assez lourde. Les extrémités des mandibules se croisent de façon plus courte que chez le bec croisé des sapins
<b>YEUX</b>	Noir.
<b>TETE</b>	Large, puissamment enchâssée dans les épaules. Front et vertex : de rouge carmin à rouge brique. Lorums et nuque : voilés de brun. Dessin des joues : brun.
<b>DOS</b>	Rouge, fortement mêlé de brun et portant un léger dessin écaillé.
<b>GORGE</b>	Rouge carmin à rouge brique uni.
<b>POITRINE</b>	Rouge plus ou moins voilé de brun.
<b>FLANCS</b>	Rouge brunâtre.
<b>VENTRE</b>	Blanc grisâtre, légèrement strié sur les côtés.
<b>AILES</b>	Rémiges : brun noirâtre, portant un étroit liseré plus clair. Grandes couvertures : bordées de brun rougeâtre.
<b>CROUPION</b>	Rouge carmin à rouge brique.
<b>SOUS-CAUDALE</b>	Porte un dessin écaillé typique qui doit être régulier.
<b>QUEUE</b>	Courte, échancrée. Rectrices : brun noirâtre, étroitement bordées de brun.
<b>PATTES</b>	Couleur corne, courtes et robustes.
<b>DOIGTS</b>	Couleur corne.
<b>ONGLES</b>	Brun noir.



Photo Philippe ROCHER

*Bec croisé perroquet femelle (Loxia pytyopsittacus)*  
~ Phénotype sauvage ~

Taille du corps : 17 cm

La femelle présente le même dessin que le mâle.  
Le rouge est remplacé par une teinte brun olive plus  
lumineuse à la poitrine et au croupion.  
Les stries sont plus marquées.



Photo Philippe ROCHER

# Genre *pinicola*

# Durbec des sapins

(*Pinicola enucleator*)

Mâle adulte



Femelle





Mâle 1<sup>ère</sup> année



Photo KBOF

*Durbec des sapins mâle (Pinicola enucleator)*  
~ *Phénotype sauvage* ~

Taille du corps : 20cm

Zone du plumage	Couleur
<b>BEC</b>	Gris noir, puissant. Mandibule supérieure bombée. L'extrémité courbée vers le bas en forme de croc
<b>YEUX</b>	Noir.
<b>TETE</b>	Assez étroite et plate, rose carmin, reflets gris noirâtre sur la zone lorale et oculaire.
<b>COU</b>	Encolure large et puissante, nuque peu marquée, rose carmin.
<b>DOS</b>	Large, rose carmin, marqué d'un écaillage gris noirâtre très régulier.
<b>GORGE et POITRINE</b>	Entièrement rose carmin.
<b>FLANCS</b>	Etroite bande gris léger soulignant l'aile.
<b>VENTRE</b>	Le rose de la poitrine se dégrade en gris blanchâtre, plus clair sur la zone anale.
<b>AILES</b>	Rémiges primaires : noirâtres, portant un fin liseré gris sur le vexille Rémiges secondaires : noirâtres, largement liserées de blanc, surtout vers l'extrémité Couvertures : noires avec bordure blanche, formant une double barre alaire très distincte.
<b>CROUPION</b>	Rose carmin.
<b>QUEUE</b>	Assez longue et échancrée. Rectrices : noirâtres, portant un très faible liseré gris brun.
<b>PATTES et DOIGTS</b>	Gris-noir.
<b>ONGLES</b>	Gris-noir.

La couleur rose-carmin ne s'exprime qu'à partir de la 2<sup>ème</sup> année. En première année la couleur est orange plus ou moins intense

Photo mâle adulte



Photo Philippe ROCHER

*Durbec des sapins femelle (Pinicola enucleator)*  
~ *Phénotype sauvage* ~

Taille du corps : 20cm

Les teintes sont plus ternes et le rose carmin est remplacé par un ton gris jaunâtre selon les individus. Le croupion est gris.




# Genre *coccothraustes*

# Gros bec casse-noyaux

(*Coccothraustes coccothraustes*)

Mâle



Mâle plumage nuptial



## *Gros bec casse-noyaux mâle (Coccothraustes coccothraustes)* ~ Phénotype sauvage ~

Taille du corps : 18cm

Zone du plumage	Couleur
<b>BEC</b>	En hiver : de couleur corne pâle. En été : de couleur bleu acier
<b>YEUX</b>	Gris brunâtre. Cercles oculaires : brun rougeâtre.
<b>TÊTE</b>	Le dessus de la tête est brun. Clair sur le front et foncé sur l'occiput Le liseré frontal, les lorums, le menton et le tour du bec sont noirs La région auriculaire et les joues sont de couleur brun jaunâtre. Le bas des joues et les parties inférieures du cou sont de couleur gris clair.
<b>DOS</b>	Le dos, le manteau et les scapulaires sont de couleur brun foncé. Le bas du dos est brun grisâtre. Le croupion et les sus caudaux sont de couleur brun jaunâtre.
<b>GORGE</b>	Menton et gorge : noir avec un léger liseré très pâle autour de la bavette (le minimum sera le meilleur).
<b>POITRINE</b>	Gris brunâtre, pâle lavé de rose.
<b>FLANCS</b>	Brun grisâtre, plus foncés que la poitrine.
<b>VENTRE</b>	Gris blanchâtre avec le sous caudale blanc.
<b>AILES</b>	Les rémiges primaires et secondaires sont noires avec des reflets métalliques. L'extrémité des rémiges primaires internes et des rémiges secondaires externes sont en forme de faucille. Les grandes couvertures alaires sont blanches et forment une barre alaire.
<b>QUEUE</b>	Courte. Les rectrices médianes sont rousses et les rectrices externes sont noires avec une extrémité blanche. Ceci forme une bande blanche à l'extrémité de la queue.
<b>PATTES et DOIGTS</b>	De couleur brun chair.
<b>ONGLES</b>	Brun foncé.



Photo Philippz ROCHER



Plumage nuptial

E. Gómez

*Gros bec casse-noyaux femelle (Coccothraustes coccothraustes)*  
~ *Phénotype sauvage* ~

Taille du corps : 18cm

La femelle a les mêmes caractéristiques que le mâle, mais les teintes sont plus pâles et plus grises.

L'extrémité de la queue de la femelle est moins blanche que chez du mâle.



Photo UOF

# Genre *rhodopechys*

# Roselin githagine

(*Rhodopechys githaginea*)

Mâle plumage nuptial



Femelle



***Roselin gihagine (Rhodopechys githaginea)***  
 ~ *Phénotype sauvage* ~

Taille du corps : 12,5cm

Zone du plumage	Couleur
<b>BEC</b>	Orangé, court, puissant, assez large à la base.
<b>YEUX</b>	Noir.
<b>TETE</b>	Assez étroite, faiblement arrondie, de forme élégante. Cou : assez long. Nuque : marquée Couleur de la tête : gris-argenté.
<b>DOS</b>	Gris-brunâtre.
<b>POITRINE</b>	Gris, avec léger reflet rose lie de vin.
<b>FLANCS</b>	Du même gris que la poitrine.
<b>VENTRE</b>	Comme la poitrine, sauf la zone anale est gris clair.
<b>AILES</b>	Longues et fines. Rémiges primaires : gris foncé Rémiges secondaires : gris-brun Couvertures : gris-brun Le vexille externe des rémiges et des couvertures portant un étroit liseré clair
<b>QUEUE</b>	De longueur moyenne, légèrement échancrée. Rectrices : gris foncé, bordées d'un liseré clair
<b>PATTES</b>	Assez longues, fines et de couleur chair.
<b>DOIGTS</b>	Couleur chair.
<b>ONGLES</b>	Gris-beige.
<b>FORME GENERALE</b>	Oiseau de forme élégante et fine.



**Mâle plumage hivernal**



**La femelle est plus terne et le bec est plus clair**

# Passeridés

# Genre *Passer*

***Moineau domestique mâle (Passer domesticus)***  
**~ Phénotype sauvage ~**

**Taille du corps** : 14.5 cm

Zones du plumage	Couleur
Lorums, région sous l'œil	Noirs. A partir de l'œil, existence d'une raie brun marron qui va en s'élargissant vers la nuque. Petit point blanc derrière l'œil.
Front, couronne, nuque	Gris.
Joues, régions parotiques	Gris blanchâtre.
Gorge, menton, milieu du haut de la poitrine	Été : noirs. Hiver : noir grisâtre avec un dessin pas aussi net qu'en été. Reste de la poitrine blanchâtre.
Épaules	Scapulaires brunes rayées de noir avec le bord blanc grisâtre formant un dessin sur les épaules.
Dos	Manteau brun marron strié de noir. Bas du dos blanc grisâtre.
Flancs	Blanc grisâtre nuancés d'une teinte isabelle.
Rémiges	Primaires brun noir avec liseré roussâtre le long du vexille externe.
Couvertures	Petites marron vif. Moyennes brun noir terminées par un bord blanchâtre formant une bande alaire. Grandes brun noir avec large bord externe roux et terminées par un bord blanchâtre.
Croupion	Gris brunâtre.
Queue	Rectrices brun noir avec liseré externe grisâtre. Sous-caudales roussâtres.
Yeux	Brun foncé.
Bec	Brun grisâtre avec la racine jaunâtre en hiver, noire en été.
Pattes, doigts	Brun clair.
Ongles	Noirs.



Photo UOF

***Moineau domestique femelle (Passer domesticus)***  
***~ Phénotype sauvage ~***

Taille du corps : 14.5 cm


Zones du plumage	Couleur
Tête	Brun avec des traits sourciliers brun jaune de la base du bec à la région parotique.
Gorge, poitrine	Gris brun. Pas de bavette ni de plastron noirs.
Epaules, ventre	Gris brun.
Dos	Brun dominant avec des stries noir brun.
Flancs	Gris brun, un peu plus foncé que la poitrine.
Ailes	Comme le mâle mais les bords des rémiges sont d'un brun plus pâle. Bande alaire typique.
Croupion	Brun.
Queue	Comme le mâle mais les bords des rectrices sont d'un brun plus pâle.
Yeux	Brun foncé.
Bec	Couleur corne.
Pattes, doigts	Brun clair.
Ongles	Noirs.



## *Moineau domestique mâle* ~ *Mutation brun* ~

Taille du corps : 14.5 cm

Zones du plumage	Couleur
Lorums	Brun foncé. Trait brun rougeâtre de derrière les yeux vers la nuque en s'élargissant. Petit point blanc derrière les yeux.
Front, couronne, nuque, croupion	Brun beige.
Joues, régions parotiques	Crème.
Gorge, menton, milieu du haut de la poitrine	Été : bavette brun foncé. Hiver : brun foncé avec un dessin pas aussi net qu'en été. Reste de la poitrine crème foncé.
Epaules	Scapulaires brun rouge rayées de brun rouge foncé avec le bord brun clair.
Dos	Manteau brun chaud avec des reflets bruns rougeâtre strié de brun très foncé.
Flancs	Crème foncé.
Rémiges	Primaires brun foncé avec liseré brun clair le long du vexille externe.
Couvertures	Petites brun rougeâtre. Moyennes brun foncé avec un liseré brun clair. Grandes brun foncé avec bord brun rougeâtre et terminées par un bord brun clair. Une autre bande alaire blanchâtre existe entre les moyennes et les grandes couvertures.
Queue	Rectrices brun chaud avec liseré externe brun clair.
Yeux	Brun foncé.
Bec	Couleur chair teinté de jaune à la base du bec en hiver, brunâtre en été.
Pattes, doigts	Couleur chair teinté de jaunâtre.
Ongles	Couleur chair.



*Moineau domestique femelle*  
~ *Mutation brun* ~

Taille du corps : 14.5 cm

Zones du plumage	Couleur
Front, couronne, nuque	Brun chaud.
Traits sourciliers, lorums	Couleur crème.
Joues	Brun clair.
Gorge, poitrine, ventre, flancs	Brun jaunâtre chaud. Couleur bien régulière.
Dos	Brun chaud strié de brun foncé.
Rémiges	Brun foncé avec les liserés plus clairs.
Couvertures	La barre alaire entre les couvertures moyennes et les grandes couvertures est crème clair. l'extrémité des grandes couvertures forme une barre alaire brun clair.
Croupion	Brun chaud.
Queue	Brun chaud.
Yeux	Brun foncé.
Bec	Couleur chair teinté de jaune à la base.
Pattes, doigts	Couleur chair.
Ongles	Couleur chair foncé.



Photo Driësmans

## *Moineau domestique mâle* ~ *Mutation « phaéo »*~

**Taille du corps** : 14.5 cm

Hérédité : la dénomination « Phaéo » concerne actuellement des caractères héréditaires différents sous un aspect identique. Etude en cours pour déterminer des appellations distinctes

Zones du plumage	Couleur
Lorums	Brun clair.
Front, couronne, nuque	Beige clair.
Traits oculaires	Brun marron à partir de l'œil en s'élargissant vers la nuque.
Joues, région parotique	Blanc sale avec léger voile brun.
Gorge	Dessin typique brun clair.
Poitrine, ventre	Blanc sale.
Dos	Blanc sale avec dessin phaéo (liseré brun) sur tout le dos.
Flancs	Blanc sale avec voile brun clair.
Rémiges, rectrices	Blanc sale avec liseré brun marron.
Couvertures	Petites brun marron. Grandes et moyennes blanc sale avec liseré brun marron. Bande alaire blanc sale entre les moyennes et les grandes couvertures.
Croupion	Beige clair avec un liseré brun marron.
Yeux	Brun foncé
Bec	Couleur chair. Parfois une flamme foncée à la base du bec.
Pattes, doigts, ongles	Couleur chair.



photo Driessmans

## *Moineau domestique femelle* ~ Mutation « phaéo »~

**Taille du corps** : 14.5 cm

Hérédité : la dénomination « Phaéo » concerne actuellement des caractères héréditaires différents sous un aspect identique. Etude en cours pour déterminer des appellations distinctes

Zones du plumage	Couleur
Front, vertex, occiput	Blanc sale avec voile brun.
Traits sourciliers, nuque, lorums, joues, régions parotiques	Brun chaud.
Gorge, poitrine, flancs	Brun clair.
Ventre	Brun clair mais plus clair que la poitrine.
Dos	Blanc sale avec dessin phaéo brun très prononcé.
Ailes	Même description que le mâle, mais les liserés sont brun chaud.
Croupion	Brun chaud avec liseré plus foncé.
Queue	Blanc sale avec liseré brun chaud sur toutes les rectrices.
Yeux	Brun foncé.
Bec	Couleur chair. Peut montrer une flamme foncée à la base du bec.
Pattes, doigts, ongles	Couleur chair.



*Moineau domestique mâle*  
~ *Mutation agate* ~

Taille du corps : 14.5 cm

Zones du plumage	Couleur
Lorums	Noirs.
Front, couronne, nuque	Gris brun léger.
Traits oculaires	Brun rouge. Petits points blancs derrière les yeux.
Joues	Gris beige.
Gorge	Bavette typique noire.
Poitrine, ventre, flancs	Gris beige.
Dos	Brun beige strié de brun noir.
Rémiges	Beiges avec un léger liseré brun noisette.
Couvertures	Petites brun noisette. Moyennes beiges avec les extrémités blanchâtres formant une bande alaire. Grandes brun beige avec un liseré beige clair.
Queue	Beiges avec liseré brun beige clair.
Croupion	Beige.
Yeux	Brun foncé.
Bec	Noir en été et chair foncé à base jaunâtre en hiver.
Pattes, doigts, ongles	Couleur chair.



photo Driësmans

*Moineau domestique femelle*  
*~ Mutation agate ~*

Taille du corps : 14.5 cm

Zones du plumage	Couleur
Tête	Gris brun foncé avec les traits sourciliers brun beige clair.
Gorge, poitrine	Beige clair avec une teinte ivoire.
Ventre, flancs	Beige clair avec une teinte ivoire.
Dos	Brun beige strié de noir.
Rémiges	Beiges.
Couvertures	Petites brun clair. Moyennes brun foncé terminées par un bord blanc sale formant une bande alaire. Grandes brun foncé avec un liseré beige clair.
Croupion	Beige.
Queue	Rectrices beiges avec liseré beige clair.
Yeux	Brun noir.
Bec	Couleur chair à base jaune.
Pattes, doigts, ongles	Couleur chair.



photo UOF

***Moineau domestique mâle***  
***~ Mutation opale ~***

Taille du corps : 14.5cm

Zones du plumage	Couleur
Lorums	Gris bleu.
Front, couronne, nuque	Gris argenté.
Traits oculaires	Gris bleu montrant encore un rien de brun noisette.
Joues	
Gorge	Gris argenté avec le dessin gris bleu typique de l'opale.
Poitrine, ventre	Gris argenté.
Dos	Gris argenté strié de gris bleu.
Ailes	Gris argenté strié de gris bleu. Un léger voile brun noisette est encore visible dans les liserés.
Queue	Gris argenté avec liserés gris bleu.
Croupion	Gris argenté.
Yeux	Noirs.
Bec	Chair foncé en hiver et noir bleuté en été.
Pattes, doigts, ongles	Couleur chair foncé.



Photo UOF

***Moineau domestique femelle***  
***~ Mutation opale ~***

**Taille du corps** : 14.5 cm

Zones du plumage	Couleur
Tête	Gris bleu.
Traits sourciliers	Gris clair avec une teinte beige.
Lorums	Gris bleu foncé.
Gorge, poitrine, ventre	Gris argenté.
Dos	Gris argenté strié de gris bleu.
Rémiges	Gris bleu clair avec un liseré beige clair sur les couvertures laissant encore voir les caractéristiques typiques des dessins de l'aile.
Croupion	Gris argenté.
Queue	Gris argenté.
Yeux	Noirs.
Bec	Chair foncé en hiver et noir grisâtre en été.
Pattes, doigts, ongles	Couleur chair foncé.



*Moineau domestique mâle*  
*~ Mutation brun pastel ~*

Taille du corps : 14.5 cm

Zones du plumage	Couleur
Couronne	Beige foncé.
Traits oculaires	Bruns.
Joues	Couleur crème.
Gorge	Bavette brun beige.
Poitrine, ventre, flancs	Beiges.
Dos	Brun clair.
Rémiges	Primaires beiges et secondaires claires avec un liseré beige long du vexille externe.
Couvertures	Petites brun clair. Moyennes brun clair avec une bande alaire beige clair. Grandes brun clair. Scapulaires brun clair.
Queue	Rectrices beiges avec un liseré clair le long du vexille externe.
Croupion	Couleur crème.
Yeux	Brun foncé.
Bec	Couleur chair avec la racine jaunâtre.
Pattes, doigts	Couleur chair
Ongles	Couleur corne.



Photo UOF

*Moineau domestique femelle*  
*~ Mutation brun pastel ~*

Taille du corps : 14.5 cm

Zones du plumage	Couleur
Tête	Couleur crème avec les traits sourciliers visibles.
Joues	Crème beige.
Gorge, poitrine	Crèmes dans l'ensemble.
Ventre, flancs	Crèmes dans l'ensemble.
Dos	Crème beige.
Rémiges	Couleur crème beige avec un liseré clair le long du vexille externe.
Couvertures, scapulaires	Crème beige.
Croupion	Crème.
Queue	Crème beige avec un liseré clair le long du vexille externe.
Yeux	Brun foncé.
Bec	Couleur chair avec la racine jaunâtre.
Pattes, doigts,	Couleur chair.
Ongles	Couleur corne.

photo UOF



***Moineau domestique***  
***~ Mutation ino (ex-albino)~***

**Taille du corps** : 14.5 cm

Zones du plumage	Couleur
Tête	Blanche légèrement teintée de jaune.
Gorge, poitrine	Blanche légèrement teintée de jaune.
Ventre, flancs	Blanche légèrement teintée de jaune.
Dos	Blanche légèrement teintée de jaune.
Ailes	Blanche légèrement teintée de jaune.
Croupion	Blanche légèrement teintée de jaune.
Queue	Blanche légèrement teintée de jaune.
Yeux	Rouges.
Bec	Couleur chair.
Pattes, doigts,	Couleur chair.
Ongles	Couleur chair.



photo Driessmans

*Moineau domestique*  
*~ Mutation blanc ~*

Taille du corps : 14.5 cm

Zones du plumage	Couleur
Tête	Blanche.
Gorge, poitrine	Blanches.
Ventre, flancs	Blancs.
Dos	Blanc.
Ailes	Blanches.
Croupion	Blanc.
Queue	Blanche.
Yeux	Noirs.
Bec	Couleur chair.
Pattes, doigts,	Couleur chair.
Ongles	Couleur chair.

*Moineau domestique*  
~ *Mutation mâle satiné* ~

Taille du corps : 14.5 cm

Zones du plumage	Couleur
Couronne	Blanc sale.
Traits oculaires	Brun rouge clair.
Joues	Couleur ivoire.
Gorge	Bavette brun clair.
Poitrine, ventre, flancs	Couleur chair.
Dos	Couleur de fond ivoire avec un dessin dorsal brun beige clair bien visible.
Rémiges	Couleur ivoire.
Couvertures	Petites brun beige clair. Moyennes blanches, formant une bande alaire. Grandes couleur ivoire.
Queue	Couleur ivoire.
Croupion	Couleur ivoire.
Yeux	Rouges.
Bec	Couleur chair.
Pattes, doigts	Couleur chair.
Ongles	Couleur chair.



Photo UOF

***Moineau domestique***  
***~ Mutation femelle satiné ~***

Taille du corps : 14.5 cm

<b>Zones du plumage</b>	<b>Couleur</b>
Couronne	Couleur ivoire légèrement striée.
Traits oculaires	Couleur ivoire.
Joues	Couleur ivoire.
Gorge	Couleur chair.
Poitrine, ventre, flancs	Couleur chair.
Dos	Couleur de fond ivoire avec un dessin dorsal beige clair bien visible.
Rémiges	Couleur ivoire.
Couvertures	Petites brun beige clair. Moyennes blanches, formant une bande alaire. Grandes couleur ivoire.
Queue	Couleur ivoire.
Croupion	Couleur ivoire.
Yeux	Rouges.
Bec	Couleur chair.
Pattes, doigts	Couleur chair.
Ongles	Couleur chair.

***Moineau friquet (Passer montanus)***  
**~ Phénotype sauvage ~**

**Taille du corps** : 13.5 - 14 cm

Zones du plumage	Couleur
Dessus de la tête, nuque	Brun chocolat.
Côtés de la tête et du cou	Blancs avec tache noire sur les joues.
Lorums, trait sous l'œil, menton	Noirs.
Epaules	Brunes.
Poitrine	Haut grisâtre et bas blanchâtre.
Flancs, sous-caudales	Bruns.
Dos	Haut du dos brun rayé de noir. Bas du dos gris brun.
Rémiges	Primaires et secondaires brun noir liserées de roux.
Couvertures	Grandes noires avec bord brun jaunâtre le long du vexille externe et le bout blanchâtre. Moyennes noires avec la pointe blanchâtre. Petites roux marron.
Queue	Rectrices brun foncé liserées de brun jaunâtre.
Croupion	Brun gris.
Yeux	Brun foncé.
Bec	Noir en été et brun foncé avec la base de la mandibule inférieure jaunâtre en hiver
Pattes, doigts	Couleur corne.
Ongles	Noirs.

**Dimorphisme sexuel** : aucun.



*Moineau friquet*  
~ *Mutation opale* ~

Taille du corps : 13.5 - 14 cm

Zones du plumage	Couleur
Front, couronne, nuque	Gris bleu.
Joues	Gris argenté avec une tache gris bleu.
Gorge	Gris argenté avec bavette gris bleu.
Poitrine	Gris argenté.
Ventre	Blanc sale.
Flancs	Gris argenté.
Dos	Gris argenté strié de gris bleu.
Rémiges	Gris argenté.
Couvertures	Petites gris bleu. Moyennes gris argenté avec extrémité blanche formant une bande alaire. Grandes gris argenté.
Queue	Gris argenté.
Croupion	Gris argenté.
Yeux	Brun noir.
Bec	Gris bleu avec du jaune à la base.
Pattes, doigts	Couleur chair foncé.
Ongles	Couleur chair foncé.

Dimorphisme sexuel : aucun.



photo Drijsmans

*Moineau friquet*  
~ *Mutation brun* ~

Taille du corps : 13.5 - 14 cm

Zones du plumage	Couleur
Front, couronne, nuque	Brun noisette clair.
Joues	Blanches avec une tache brun foncé au milieu.
Lorums	Brun foncé.
Gorge	Blanche avec bavette brun foncé.
Poitrine	Couleur isabelle.
Ventre	Blanc.
Flancs, croupion	Brun jaune chaud.
Dos	Brun jaune chaud, strié de brun foncé.
Rémiges	Brun jaune.
Couvertures	Petites brun noisette clair. Moyennes brun jaune chaud avec bord blanc à l'extrémité (ceci formant une bande alaire). Grandes brun jaune avec un liseré isabelle.
Queue	Brun jaune chaud.
Yeux	Brun foncé.
Bec	Brun et jaune à la base.
Pattes, doigts	Couleur chair.
Ongles	Couleur chair.

Dimorphisme sexuel : aucun.



*Moineau friquet*  
~ *Mutation brun opale* ~

Taille du corps 13.5 - 14 cm

Zones du plumage	Couleur
Front, vertex, occiput	Brun beige.
Joues	Gris blanc avec tache brun beige au milieu.
Gorge	Gris blanc avec bavette brun beige.
Poitrine	Gris blanc avec un léger voile beige clair.
Ventre	Gris blanc avec un léger voile beige clair.
Flancs	Gris blanc avec un léger voile beige clair.
Dos	Manteau gris, strié de brun beige.
Rémiges	Grandes gris blanc avec un liseré beige. Secondaires gris blanc avec un liseré brun beige.
Couvertures	Petites brun beige. Moyennes et grandes gris blanc avec un liseré brun beige.
Croupion	Brun beige.
Queue	Rectrices gris blanc légèrement voilé de beige.
Yeux	Brun noir.
Bec	Brun foncé.
Pattes, doigts	Couleur chair.
Ongles	Couleur chair.

Dimorphisme sexuel : aucun.



***Moineau espagnol***  
**~ *Passer hispaniolensis* ~**

Taille du corps : 14.5 cm

Zones du plumage	Couleur
<b>BEC</b>	En hiver : brun grisâtre avec la racine jaunâtre. En été : noir Forme : conique et robuste.
<b>YEUX</b>	Noir.
<b>TETE</b>	Assez puissante et plate, encolure large. Large trait loreal noir, s'affinant en arrière de l'oeil. Fin sourcil blanc. Front, sommet du crâne et nuque : entièrement brun roux. Le dessin de la nuque s'élargit à l'arrière de la joue. Joues : blanc lumineux, légèrement ombré de gris.
<b>DOS</b>	Entièrement écaillé de noir sur fond gris beige clair.
<b>GORGE</b>	Entièrement noir uniforme.
<b>POITRINE</b>	Noir uni, se dégradant en écaillage noir à la base L'étendue du noir de la poitrine est variable
<b>FLANCS</b>	Entièrement marqués de larges écailles noires sur fond gris blanc.
<b>VENTRE</b>	Blanchâtre.
<b>AILES</b>	Rémiges primaires : gris noir, liserées de brun Le liseré des rémiges secondaires est plus large.. Les couvertures sont roussâtres, liserées de blanc Le liseré des couvertures primaires <u>est plus large et</u> forme une bande alaire.
<b>CROUPION</b>	Gris foncé
<b>QUEUE</b>	Rectrices gris noir, bordées de noir.
<b>PATTES et DOIGTS</b>	Gris brun foncé.
<b>ONGLES</b>	Gris noir.
<b>FORME GENERALE</b>	Un peu plus élancé que le moineau domestique. Robuste et élégant.

Dimorphisme sexuel : La femelle ressemble à celle du moineau domestique avec un écaillage plus net et plus foncé sur le dos. Les stries des flancs et le trait loreal sont plus marqués.

# Genre *Petronia*

***Moineau soulcie***  
**~ *Petronia petronia* ~**

Taille du corps : 14 cm

Zones du plumage	Couleur
<b>BEC</b>	Conique et robuste. Corne foncé à la mandibule supérieure, ocre jaune à la mandibule inférieure. La pointe de la mandibule supérieure est plus foncée.
<b>YEUX</b>	Brun foncé.
<b>TETE</b>	Plate, encolure large. Sommet du crâne gris beige clair, délimité de chaque côté par une bande longitudinale gris brun foncé qui s'étire vers la nuque. Les deux barres se rejoignent sur le front. Sourcils et moustaches : gris beige, très clair. Dessin des joues gris brun.
<b>DOS</b>	Couleur de fond gris beige, marqué d'un écaillage très net gris brun foncé.
<b>GORGE</b>	Gris beige clair, soulignée à la base par une tache oblongue jaune plus ou moins nette.
<b>POITRINE</b>	Gris beige, légèrement écaillé.
<b>FLANCS</b>	Gris beige, marqués d'un écaillage plus foncé.
<b>VENTRE</b>	Beige clair, zone anale marquée de brun.
<b>AILES</b>	Rémiges et couvertures primaires : brun noirâtre, liseré de beige. Rémiges secondaires externes sont marquées de beige très clair à leur extrémité. Couvertures secondaires : sont largement liserées de beige très clair.
<b>CROUPION</b>	Beige clair, strié de brun
<b>QUEUE</b>	Assez courte. Rectrices brun noirâtre, liserées de gris beige et bordées de blanchâtre à leur extrémité.
<b>PATTES et DOIGTS</b>	Brun foncé.
<b>ONGLES</b>	Gris noir.
<b>FORME GENERALE</b>	Robuste et trapu.



# Genre *Montifringilla*

*Niverolle*  
~ *Montifringilla nivalis* ~

Taille du corps : 17 cm

Zones du plumage	Couleur
<b>BEC</b>	Conique, assez robuste et pointu. Jaune à la base et noirâtre à la pointe. Le bec devient entièrement noir en été.
<b>YEUX</b>	Noir.
<b>TETE</b>	Calotte : crânienne. Nuque et joues : gris-ardoise. Lorums : gris-noirâtre. Bavette : noirâtre, plus distincte en été qu'en hiver. Couvrant le menton et arrondie à son contour inférieur. La bavette est séparée du gris de la tête par une ligne moustachale oblique de couleur gris clair, qui joint le dessin de la joue et se fond dans la couleur de la poitrine.
<b>DOS</b>	Brun foncé, tranchant nettement sur le gris foncé de la nuque. Le pourtour de chaque plume dorsale est plus clair que le centre, ce qui dessine un écaillage très régulier de la totalité du manteau.
<b>POITRINE</b>	Du même gris clair uni que la base des joues, allant en s'éclaircissant vers le ventre.
<b>FLANCS</b>	Gris uniforme comme la poitrine, plus clair au voisinage de la queue.
<b>VENTRE</b>	Blanc sale jusqu'à la partie anale.
<b>AILES</b>	Couvertures et rémiges secondaires : blanc sale, déterminant une large plage blanche sur l'aile. Les rémiges secondaires internes portent une marque brun foncé avec liseré plus clair. Rémiges primaires : noires sur les deux tiers de leur



	longueur terminale et blanches à leur base. Rémiges bâtardes : noires, ce qui dessine un très court miroir blanc. Les ailes sont assez longues et recouvrent la queue jusqu'au deux tiers.
<b>CROUPION</b>	Noirâtre.
<b>QUEUE</b>	Les deux rectrices centrales sont brunâtres chez les jeunes et noires chez les adultes. Toutes les autres sont blanches avec l'extrémité noire sur environ 1 cm. La queue est de longueur moyenne et légèrement échancrée.
<b>PATTES et DOIGTS</b>	Noir
<b>ONGLES</b>	Noir.
<b>FORME GENERALE</b>	Oiseau d'aspect robuste sans être lourd.

**Dimorphisme sexuel** : Il n'y a pas de dimorphisme marqué entre les sexes.  
La bavette de la femelle n'est cependant que très légèrement marquée.

**défauts classiques des niverolles males et femelles**

- \* Manque de netteté dans l'écaillage dorsal.
- \* Bavette totalement absente (sujet en plumage juvénile avant 1ere mue).
- \* Dessin mal délimité.
- \* Ailes croisées ou pendantes.

# Bombycillidés

# Genre *Bombycilla*

***Jaseur boréal (Bombycilla garrulus)***  
**~ Phénotype sauvage ~**

Taille du corps : 18 cm

Zones du plumage	Couleur
<b>BEC</b>	Noir avec une couleur chair à la racine. Une ligne blanche est visible à la base de la mandibule inférieure.
<b>YEUX</b>	Brun foncé.
<b>TETE</b>	Possède une huppe érectile de couleur lie de vin. Front, lorums, traits sourciliers, menton et gorge : noir. La couleur du front et de l'avant des joues est rouille. La région auriculaire, les joues, le haut de la poitrine et l'occiput sont lie de vin..
<b>DOS</b>	Manteau, scapulaires et couvertures alaires sont de couleur brun foncé, devenant graduellement gris vers le sus caudale..
<b>POITRINE</b>	Gris brunâtre pâle.
<b>VENTRE et FLANCS</b>	Gris brunâtre pâle. Le centre du ventre est jaunâtre
<b>AILES</b>	Rémiges primaires : noires, bordées d'une ligne blanche avec l'extrémité du vexille externe jaune. Rémiges secondaires : de couleur noir grisâtre avec à leur extrémité une large tache blanche, terminée par des spots cornés rouge vif
<b>QUEUE</b>	Rectrices : grises à la racine, devenant graduellement noirâtres. L'extrémité des rectrices est jaune, ceci forme une bande jaune à l'extrémité de la queue. Sous-caudale : roux.
<b>PATTES, DOIGTS &amp; ongles</b>	Noir

Photo UOF



# Turdidés

# Genre *Turdus*

*Merle noir mâle (Turdus merula)*  
~ *Phénotype sauvage* ~

Taille du corps : 24/25 cm

Zones du plumage	Couleur
Tête	La totalité du plumage est uniformément noire
Dos	-idem-
Gorge, poitrine	-idem-
Flancs, ventre	-idem-
Ailes	Noir. En 1 <sup>ère</sup> année, brun noirâtre
Croupion	-idem-
Queue	Noir. En 1 <sup>ère</sup> année, brun noirâtre
Yeux	Noir. Cercle oculaire jaune à orange
Bec	Jaune à orange
Pattes, doigt, ongles	Gris brun



*Merle noir femelle (Turdus merula)*  
~ *Phénotype sauvage* ~

Taille du corps : 24/25 cm

Zones du plumage	Couleur
Tête	Gris brun foncé
Dos	-idem-
Gorge, poitrine	Menton gris beige pointillé noir. Poitrail brun écaillé
Flancs, ventre	Brun écaillé brun foncé
Ailes	Gris brun foncé
Croupion	-idem-
Queue	-idem-
Yeux	Brun noir
Bec	Brun foncé. Peut porter des marques jaunes
Pattes, doigt, ongles	Brun foncé



Photo Lionel Durochat

*Merle noir mâle*  
*~ Mutation pastel ~*

Taille du corps : 24/25 cm

Zones du plumage	Couleur
Tête	Grises, légèrement striée
Dos	Gris argenté, avec un liseré foncé sur les couvertures et de légères striées sur le milieu.
Gorge, poitrine	Gris argenté, avec de légères stries interrompues.
Flancs, ventre	Gris argenté avec un dessin en forme de gouttes.
Ailes	Rémiges primaires gris foncé avec une barre alaire gris clair (les jeunes oiseaux ont des scapulaires foncées).
Croupion	Gris argenté avec un liseré foncé sur les couvertures.
Queue	Gris foncé, plus claire que les rémiges primaires.
Yeux	Brun foncé avec cercle oculaire jaunâtre.
Bec	Jaune orange chez l'adulte.
Pattes, doigt, ongles	Bruns.



*Merle noir femelle*  
*~ Mutation pastel ~*

Taille du corps : 24/25 cm

Zones du plumage	Couleur
Tête	Gris très foncé avec un léger pigment et liseré.
Dos, gorge, poitrine	Gris foncé, légèrement striés.
Flancs, ventre	Gris foncé, avec un dessin en forme de gouttelettes.
Ailes	Gris foncé (les jeunes oiseaux ont des scapulaires encore plus foncées).
Croupion	Gris foncé, légèrement striés.
Queue	Gris très foncé.
Yeux	Brun foncé avec un cercle oculaire orange.
Bec	Brun foncé à base orangée.
Pattes, doigt, ongles	Bruns.



***Merle noir***  
***~ Mutation ino (ex-albino)~***

Taille du corps : 24/25 cm

Zones du plumage	Couleur
Corps	Blanc légèrement coloré.
Ailes	Blanches.
Queue	Blanche.
Yeux	Rouges avec cercle oculaire jaunâtre.
Bec	Jaune.
Pattes, doigts	Couleur chair.
Ongles	Couleur chair.

Le blanc pur à yeux rouge est dénommé albino



*Merle noir*  
~ *Mutation blanc* ~

Taille du corps : 24/25 cm

Zones du plumage	Couleur
Corps	Blanc.
Ailes	Blanches.
Queue	Blanche.
Yeux	Noirs avec cercle oculaire jaunâtre.
Bec	Jaune.
Pattes, doigts	Couleur chair.
Ongles	Couleur chair.



Photo Drijsmans

***Grive musicienne (Turdus philomelos)***  
**~ Phénotype sauvage ~**

**Taille du corps** : 23 cm

Zones du plumage	Couleur
Tête	Vertex et occiput brun chaud. Vertex pointillé brun foncé. Sourcil et cercle oculaire crème. Lore noir brun pointillé crème . joue brun pointillé noir
Gorge	Beige clair uni. Délimitée par deux traits foncés
Dos	Brun chaud. Croupion et sous caudales bruns
Poitrine	Beige clair. Dessin brun foncé en forme de pointe de flèche
Couvertures	Brun légèrement liseré de blanc formant une légère barre alaire
Rémiges	Brun foncé chaud. Liseré externe plus clair
Croupion	Brun
Queue	Brun foncé chaud
Yeux	Brun foncé
Bec	Brun noir. Base inférieure jaunâtre
Pattes, doigts	Rose chair
Ongles	Foncés



photo OF

*Grive musicienne*  
~ *Mutation brun* ~

Taille du corps : 23 cm

Zones du plumage	Couleur
Tête	Brun clair.
Gorge	Couleur crème
Dos	Brun clair.
Poitrine	Crème avec dessin brun clair en forme de gouttes.
Couvertures	Petites et moyennes couvertures brun clair. grandes couvertures brun clair avec dessin scapulaire crème.
Rémiges	Brun clair.
Croupion	Brun clair.
Queue	Brun clair.
Yeux	Bruns.
Bec	Couleur chair.
Pattes, doigts	Couleur chair.
Ongles	Couleur chair.



Photo UOF

*Grive musicienne*  
~ *Mutation blanche* ~

Taille du corps : 23 cm

Zones du plumage	Couleur
Corps	Blanc pur sans aucun dessin.
Ailes	Blanches.
Queue	Blanche.
Yeux	Rouges.
Bec	Noirs.
Pattes, doigts	Couleur chair.
Ongles	Couleur chair.

Remarque : il existe aussi une mutation albinos qui se différencie de la mutation blanche



Photo Drizsmans

## *Grive musicienne* ~ *Mutation satiné*

Taille du corps : 23 cm

Zones du plumage	Couleur
Tête	Crème clair avec des écailles brun clair sur le vertex et un voile brun clair sur les joues.
Gorge	Crème clair. Moustaches brun clair visibles de chaque côté de la gorge.
Dos	Crème clair.
Poitrine, flancs	Crème clair avec dessin brun clair en forme de gouttes bien réparties sur la poitrine.
Couvertures	Crème clair avec un dessin d'épaule et une barre alaire brun clair.
Croupion	Crème clair.
Queue	Crème clair avec un dessin brun clair visible aux sous-caudales.
Yeux	Rouge foncé.
Bec	Couleur chair.
Pattes, doigts	Couleur chair.
Ongles	Couleur chair.



*Grive draine*  
~ *Turdus viscivorus* ~

Taille du corps : 27 cm

Zones du plumage	Couleur
<b>BEC</b>	De couleur corne foncée avec la base de la mandibule inférieure jaune
<b>YEUX</b>	Brun avec cercle oculaire gris blanchâtre
<b>TETE</b>	Gris brun à brun. Lorum : gris blanc. Région auriculaire : gris blanc avec liserés plus foncés.
<b>DOS</b>	Brun à gris brun avec une nuance jaunâtre plus claire.
<b>MENTON et GORGE</b>	Jaunâtre, teinté de brun avec un dessin de petites taches brun foncé. Dessin des moustaches : brun foncé et pas très net
<b>POITRINE</b>	Le haut de la poitrine est jaunâtre avec un dessin de petites taches brun foncé en forme de pointes de flèches qui s'agrandissent progressivement sur la poitrine.
<b>VENTRE et FLANCS</b>	Jaune brunâtre avec un dessin de taches brun foncé
<b>AILES</b>	Rémiges de couleur brun foncé avec un liseré plus clair le long du vexille externe. L'extrémité des rémiges est blanchâtre. Les grandes, les moyennes et les petites couvertures sont de couleur brun foncé avec un liseré plus clair.
<b>QUEUE</b>	Rectrices de couleur brun grisâtre avec un liseré plus clair le long du vexille externe.
<b>CROUPION</b>	Brun à brun gris.
<b>SUS CAUDALE</b>	Brun à gris brun avec liseré blanc.

Photo RBOF



<b>PATTES et DOIGTS</b>	De couleur jaune brunâtre.
<b>ONGLES</b>	Foncé

**Pas de dimorphisme sexuel** : Il n'y a pas de dimorphisme marqué entre les sexes.

**défauts classiques les grives draines males et femelles**

- \* Dessin de la poitrine irrégulier..
- \* Sourcils irrégulier
- \* Cercles oculaires irréguliers.
- \* Dessin des couvertures pas net.

*Grive mauvis*  
~ *Turdus iliacus* ~

Taille du corps : 21 cm

Zones du plumage	Couleur
<b>BEC</b>	Brun noir avec la base de la mandibule inférieure jaunâtre
<b>YEUX</b>	De couleur noirâtre
<b>TETE</b>	Longs sourcils réguliers de couleur crème. Moustaches de couleur crème. Lorums de couleur brun foncé. Région auriculaire de couleur brun foncé avec une nuance crème Long trait de couleur crème en dessous de l'œil. Couronne de couleur brun foncé avec des écailles noires.
<b>COU</b>	Brun foncé avec une tache beige de chaque côté du cou.
<b>MANTEAU</b>	Brun foncé avec un léger dessin écaillé.
<b>CROUPION</b>	Brun, un peu plus clair que le manteau.
<b>SUS CAUDALE</b>	Brun, un peu plus clair que le manteau.
<b>MENTON et GORGE</b>	Blanc sale avec un dessin strié brun. La gorge est bordée d'une bande noirâtre découpée et qui suit les moustaches.
<b>POITRINE</b>	Blanc sale, tachetée de brun foncé.
<b>FLANCS</b>	Brun rouge à la partie supérieure des flancs et blanc sale, strié de brun à la partie inférieure des flancs
<b>VENTRE</b>	Blanchâtre.
<b>AILES</b>	De couleur brun foncé avec le vexille externe des rémiges beige.



Photo KBOF

	Les grandes sus alaires sont ourlées de beige.
<b>QUEUE</b>	De couleur brun foncé.
<b>SOUS CAUDALE</b>	Blanc sale avec un dessin écaillé de brun
<b>PATTES et DOIGTS</b>	De couleur chair foncé.
<b>ONGLES</b>	Noir.

**Dimorphisme sexuel** : Il n'y a pas de dimorphisme marqué entre les sexes.

**défauts classiques des grives mauvis et femelles**

- \*Sourcils irréguliers.
- \*Dessin de la poitrine irrégulier.
- \*Barre alaire irrégulière.
- \*Moustaches irrégulières.
- \*Couleur des flancs pas assez visible.

## *Grive litorne* ~ *Turdus pilaris* ~

Taille du corps : 25 cm

Zones du plumage	Couleur
<b>BEC</b>	Jaune orange avec l'extrémité et une partie de la mandibule supérieure noir brunâtre
<b>YEUX</b>	Brun foncé.
<b>TETE</b>	Front et vertex : bleu grisâtre avec un dessin en forme de pointe de flèche noirâtre. Lorum : noir. Partie située en dessous de l'oeil : noir. Sourcils : gris blanc. Voile gris clair sur les régions auriculaires. Nuque et occiput : bleu grisâtre
<b>DOS</b>	Manteau et couvertures alaires brun foncé avec des liserés plus clairs.
<b>CROUPION</b>	Bleu grisâtre. Couvertures sus caudales : brunâtres.
<b>MENTON et GORGE</b>	Jaune roux avec un dessin en forme de pointe de flèche noirâtre.
<b>POITRINE</b>	D'un brun chaud avec un dessin en forme de grand fer de lance noir.
<b>VENTRE</b>	Blanchâtre
<b>FLANCS</b>	Brun chaud avec un dessin en forme de grand fer de lance noir
<b>AILES</b>	Rémiges de couleur brun noir avec les liserés externes grisâtres. L'extrémité des rémiges secondaires blanchâtres.
<b>QUEUE</b>	Rectrices de couleur brun noir avec des liserés externes plus clairs sur la paire de rectrices externes.
<b>PATTES et DOIGTS</b>	De couleur brune.
<b>ONGLES</b>	Brun foncé.



Photo KBOF

Dimorphisme sexuel : La femelle a les mêmes caractéristiques que le mâle mais les parties grises du mâle sont plus brunes chez la femelle. Les dessins noirs de la tête sont plus petits. Les flancs sont plus brunâtres.

# Sturnidés

# Genre *Sturnus*

*Etourneau sansonnet (Sturnus vulgaris)*  
~ *Phénotype sauvage* ~

Taille du corps : 21.5 cm

Zones du plumage	Couleur
Tête	Noir irisé pointillé blanc. Hiver : reflet brun
Dos	-idem-
Gorge, poitrine	-idem-
Flancs, ventre	-idem-
Ailes	Eté : noir liseré brun. Hiver : reflet brun
Croupion	Eté : noir pointillé blanc. Hiver : reflet brun
Queue	Eté : noir liseré brun. Hiver : plus brun
Yeux	Brun foncé. Proches du bec
Bec	Eté : jaune citron . hiver : gris foncé ,base jaunâtre
Pattes, doigt, ongles	Eté : rouge brun. Hiver : gris foncé




Photo Driësmans

*Etourneau sansonnet*  
~ *Mutation brun* ~

Taille du corps : 21.5 cm

Zones du plumage	Couleur
Tête	Eté : brun noirâtre pointillé blanc Hiver : voile brun
Dos, gorge, poitrine	idem
Flancs	idem
Ailes	Brun noirâtre liseré brun, plus visible en hiver
Croupion	Eté : brun noirâtre pointillé blanc. Hiver :voile brun
Queue	Brun noirâtre liseré brun, plus visible en hiver
Yeux	Noirs
Bec	Eté : jaunâtre. Hiver gris brun
Pattes, doigt, ongles	Gris brun

photo Driessmans



*Etourneau sansonnet*  
~ *Mutation agate* ~

Taille du corps : 21.5 cm

Zones du plumage	Couleur
Tête	Gris foncé (bleuté) avec pointillés beiges.
Dos	Gris brun avec pointillés beiges.
Gorge	Blanc crème.
Flancs, poitrine	Gris foncé avec des dessins pointillés blancs.
Ailes	Brun grisâtre. Les extrémités des rémiges primaires sont plus foncées. Rémiges secondaires plus claires, avec le liseré brun clair.
Croupion	Gris foncé, liseré de gris beige.
Queue	Gris foncé, plumes bordées de gris beige.
Yeux	Brun foncé avec pupille jaune brun.
Bec	Gris clair à base jaune.
Pattes, doigt	Couleur chair.
Ongles	Couleur corne.

Photo Driçsmans



*Etourneau sansonnet*  
~ *Mutation phaèò* ~

Taille du corps : 21.5 cm

Zones du plumage	Couleur
Tête	Couleur de fond blanc crème avec un dessin d'écailles blanches, avec un liseré brun qui donne un aspect pointillé blanc et brun.
Dos, gorge, poitrine	Couleur de fond blanc crème avec un dessin d'écailles blanches, avec un liseré brun qui donne un aspect pointillé blanc et brun.
Flancs	Couleur de fond blanc crème avec un dessin d'écailles blanches, avec un liseré brun qui donne un aspect pointillé blanc et brun.
Ailes	Rémiges primaires blanches avec un léger liseré brun. Rémiges secondaires blanches avec un liseré brun plus large. Couvertures beige clair avec un large liseré brun.
Croupion	Beige clair avec des écailles de brunes.
Queue	Brun clair.
Yeux	Rouges.
Bec	Été : jaunâtre. Hiver : gris clair
Pattes, doigt, ongles	Couleur chair.



Photo Drijsmans

*Etourneau sansonnet*  
~ Mutation blanc ~

Taille du corps : 21.5 cm

Zones du plumage	Couleur
Tête	Blanc terne avec apparence de pointillés
Dos, gorge, poitrine	idem-
Flancs	idem-
Ailes	Blanc
Croupion	Blanc
Queue	Blanc
Yeux	Noir
Bec	Gris rosé
Pattes, doigt, ongles	Rose chair




Photo Drizsmans

*Etourneau sansonnet*  
~ *Mutation pastel* ~

Taille du corps : 21.5 cm

Zones du plumage	Couleur
Tête	Eté : gris argenté pointillé blanc Hiver : Voile beige
Dos, gorge, poitrine	-idem-
Flancs	-idem-
Ailes	Gris argenté léger liseré beige, plus visible l'hiver
Croupion	Eté : gris pointillé blanc. Hiver : voile beige
Queue	Gris argenté liseré beige, plus visible en hiver
Yeux	Noirs
Bec	Eté : jaune clair. Hiver : gris rosé.
Pattes, doigt, ongles	Gris clair



Photo Drizsmans

# Corvidés

# Genre *Garrulus*

*Geai des chênes (Garrulus glandarius)*  
~ *Phénotype sauvage* ~

Taille du corps : 34 cm

Zones du plumage	Couleur
Tête	Gris beige strié noir sur le crane. Joues gris beige lavé de rose Moustache noire. Menton blanchâtre
Dos, gorge, poitrine	Dos gris beige. Poitrail beige lavé de rose
Flancs	Beige lavé de rose
Ailes	Epaule bleu strié noir. Aile noire avec miroir blanc
Croupion	Blanc. Ventre blanc
Queue	Noire
Yeux	Noirs. Cercle oculaire gris
Bec	Gris foncé
Pattes, doigt, ongles	Gris beige pâle



photo Driessmans

## *Geai des chênes* ~ *Mutation opale* ~

Taille du corps : 34 cm

Zones du plumage	Couleur
Tête	Gris argenté avec un voile clair de brun rose, strié de gris foncé et que l'oiseau peut relever en forme de huppe. Deux larges moustaches gris foncé.
Occiput	Brun clair avec un voile rose
Gorge	Blanc sale.
Dos	Manteau blanc argenté avec un voile gris clair.
Poitrine, flancs	Gris argenté avec un voile gris clair.
Ailes	Rémiges primaires gris clair avec les externes gris argenté. Rémiges secondaires gris clair avec les externes plus claires. Dessin caractéristique des ailes d'un bleu plus clair mais encore bien visible.
Croupion	Blanc.
Queue	Sus-caudales gris clair et sous-caudales gris foncé.
Yeux	Bleu clair, avec cercle oculaire gris foncé.
Bec	Gris foncé.
Pattes, doigts	Couleur chair foncé.
Ongles	Couleur corne clair.




Photo Drigsmans

# Genre *Pica*

*Pie bavarde (Pica pica)*  
~ *Phénotype sauvage* ~

Taille du corps : 48 cm

Zone du plumage	Couleur
<b>BEC</b>	Noir avec des soies rictales noires.
<b>YEUX</b>	Noirâtres.
<b>TETE - COU - DOS GORGE - JAMBES HAUT de la POITRINE et SUS et SOUS CAUDALE</b>	Noir de jais brillant.
<b>TETE et SCAPULAIRES</b>	Noir avec un reflet pourpre verdâtre.
<b>BAS de la POITRINE VENTRE - FLANCS et GRANDES SUS ALAIRES</b>	Blanc.
<b>AILES</b>	Rémiges primaires et secondaires : noires avec un reflet métallique.
<b>QUEUE</b>	Rectrices : noires avec des reflets métalliques et longues. Les rectrices

**Remarque : les premières rémiges externes sont toujours graduellement plus courte que les autres.**



Photo Philippe ROCHER

*Pie bavarde (Pica pica)*  
~ Mutation brune ~

Taille du corps : 48 cm

Zone du plumage	Couleur
<b>BEC</b>	Brun avec des soies rictales brunes.
<b>YEUX</b>	brun.
<b>TETE - COU - DOS GORGE - JAMBES HAUT de la POITRINE et SUS et SOUS CAUDALE</b>	Brun.
<b>SCAPULAIRES</b>	brun.
<b>BAS de la POITRINE VENTRE - FLANCS et GRANDES SUS ALAIRES</b>	Blanc.
<b>AILES</b>	Rémiges primaires et secondaires : brun.
<b>QUEUE</b>	Rectrices : brunes



**Remarque : les premières rémiges externes sont toujours graduellement plus courte que les autres.**

# Genre *Corvus*

***Choucas des tours (Corvus monedula)***  
**~ Phénotype sauvage ~**

Taille du corps : 33 cm

Zone du plumage	Couleur
<b>BEC</b>	Noir avec des soies rictales noires
<b>YEUX</b>	Gris bleu avec la pupille noire.
<b>COURONNE FRONT</b>	Noir à reflets bleutés.
<b>NUQUE et JOUES</b>	Gris argenté.
<b>DOS</b>	Noir avec des reflets bleutés.
<b>MANTEAU CROUPION COUVERTURES SUS CAUDALES</b>	Noir avec des reflets métalliques.
<b>GORGE - MENTON VENTRE FLANCS</b>	Noir.
<b>AILES</b>	Noir avec un reflet bleuté.
<b>QUEUE</b>	Noir.
<b>PATTES et DOIGTS</b>	Noir.
<b>ONGLES</b>	Noir.



Photo Philippe ROCHER

**Remarque :** l'extrémité des ailes touche presque l'extrémité de la queue.  
 les trois premières rémiges primaires sont graduellement plus courtes que les suivantes.

## *Corneille noire (Corvus corone corone )* ~Phénotype sauvage ~

Taille du corps : 47 cm

Zones du plumage	Couleur
<b>BEC</b>	Noir avec des soies rictales noires. Pointe de la mandibule supérieure plus ou moins courbée.
<b>YEUX</b>	Noir.
<b>PLUMAGE du CORPS</b>	Entièrement noir à reflets violacés.
<b>GORGE</b>	Les plumes de la gorge et des côtés du cou sont un peu allongées et pointues.
<b>AILES</b>	Les rémiges primaires et secondaires sont noires à reflets verdâtres.
<b>QUEUE</b>	Les rectrices sont noires et la forme de la queue est arrondie.
<b>PATTES et DOIGTS</b>	Noir.
<b>ONGLES</b>	Noir.



Pas dimorphisme sexuel :

défauts classiques des niverolles males et femelles

- \* Soies rictales abimées..
- \* Pas de lustre.



## *Corbeau freux (Corvus frugilegus)* ~Phénotype sauvage ~

Taille du corps : 48 cm

Zones du plumage	Couleur
<b>BEC</b>	Noir. Le bec est plus droit et plus effilé que chez la corneille noire. Il possède la base du bec décharnée (gris blanchâtre). La base du bec se dénude graduellement vers la deuxième année, donc, en plumage juvénile, le freux n'a pas la base du bec décharnée.
<b>YEUX</b>	Noir.
<b>PLUMAGE du CORPS</b>	Entièrement noir à reflets violacés.
<b>AILES</b>	Rémiges primaires et secondaires noires à reflets violacés.
<b>QUEUE</b>	Les rectrices sont noires et la forme de la que est arrondie.
<b>PATTES et DOIGTS</b>	Noir.
<b>ONGLES</b>	Noir.



### Pas de dimorphisme sexuel

**Remarque** une caractéristique typique du freux est la culotte (plumage lâche aux cuisses N.B. ne pas punir.). Attention à la composition de l'aile des corvidés.

1. La première rémige mesure la moitié de la longueur de la seconde.
2. La deuxième rémige mesure les trois quart de la longueur de la première
3. Les troisièmes et quatrièmes rémiges primaires sont les deux plus longues

Lors du jugement des corvidés, il faut tenir compte de cette caractéristique et ne jamais écrire : “ rémige trop courte ou en repousse

*Corneille mantelée (Corvus corone cornix)*  
~ *Phénotype sauvage* ~

Taille du corps : 47 cm

Zones du plumage	Couleur
<b>BEC</b>	Noir, recouvert des soies rictales noires
<b>YEUX</b>	Noir.
<b>MANTEAU</b>	Tête, cou, gorge et haut de la poitrine sont noirs avec un reflet métallique. Les autres parties : dos, ventre, flancs et croupion sont gris bleu.
<b>GORGE</b>	Les plumes de la gorge et du côté du cou sont effilées et pointues
<b>AILES</b>	Rémiges primaires, secondaires et couvertures sont noires.
<b>QUEUE</b>	Rectrices : noir. La forme de l'extrémité de la queue est arrondie.
<b>PATTES et DOIGT</b>	Noir
<b>ONGLES</b>	Noir

Dimorphisme sexuel : Il n'y a pas de dimorphisme marqué entre les sexes.  
défauts classiques

- \* Soies rictales abimées..
- \* Couvertures du manteau irrégulier  
Dessin des parties gris bleu irrégulier.

## *Grand corbeau (Corvus corax)* ~ *Phénotype sauvage* ~

Taille du corps : 64 cm

Zones du plumage	Couleur
<b>BEC</b>	Noir, recouvert des soies rictales noires
<b>YEUX</b>	Noir.
<b>MANTEAU</b>	Tête, cou, gorge et haut de la poitrine sont noirs avec un reflet métallique. Les autres parties : dos, ventre, flancs et croupion sont noirs.
<b>GORGE</b>	Les plumes de la gorge et du côté du cou sont effilées et pointues
<b>AILES</b>	Rémiges primaires, secondaires et couvertures sont noires.
<b>QUEUE</b>	Rectrices : noir. La forme de l'extrémité de la queue est arrondie.
<b>PATTES et DOIGT</b>	Noir
<b>ONGLES</b>	Noir




Dimorphisme sexuel : Il n'y a pas de dimorphisme marqué entre les sexes.

### Défauts classiques

- \* Soies rictales abimées.
- \* Couverture du manteau irrégulier

# « Topographie » d'un oiseau



## FORMES ET TAILLES



Sizerin flammé 135 - 140 mm



Sizerin cabaret 125 - 135 mm



bouvreuil  
145 - 165 mm



Tarin des aulnes  
115 - 125 mm



Pinson des arbres  
150 mm  
Pinson du Nord  
160 mm



Verdier 145 - 170 mm

## *Mutations de la faune européenne homologuées par la COM/OMJ*

### Tarin des aulnes (*Carduelis spinus*)

Phénotype « sauvage »	Dominant
Brun	Récessif, lié au sexe
Agate	Récessif, lié au sexe
Isabelle	Récessif, lié au sexe
Facteur « dilué & double dilué »	Dominant, autosomal
Ivoire	Récessif, lié au sexe

### Sizerin Flammé (*Carduelis flammea*)

Phénotype « sauvage »	Dominant
Brun	Récessif, lié au sexe
Pastel (Agate)	Récessif, lié au sexe
Brun pastel (isabelle)	Récessif, lié au sexe
Ecaillé (pastel)	Récessif, lié au sexe
Facteur « foncé »	Dominant, autosomal
Phaéo	Récessif, autosomal

### Verdier d'Europe (*Carduelis chloris*)

Phénotype « sauvage »	Dominant
Isabelle	Récessif, lié au sexe
Agate	Récessif, lié au sexe
Brun	Récessif, lié au sexe
Satiné	Récessif, lié au sexe
Lutino	Récessif, lié au sexe
Facteur « Pastel »	Récessif, lié au sexe

### Chardonneret élégant (*Carduelis carduelis*)

Phénotype « sauvage »	Dominant
Brun	Récessif, lié au sexe
Agate	Récessif, lié au sexe
Facteur « Pastel »	Récessif, lié au sexe
Isabelle	Récessif, lié au sexe
Satiné	Récessif, lié au sexe
Lutino	Récessif, lié au sexe
Blanc masque orange	Récessif, autosomal
Tête blanche	Récessif, autosomal

Jaune	Dominant, autosomal
Aminet (eumo)	Récessif, lié au sexe**

### Pinson des arbres (*Fringilla coelebs*)

Phénotype « sauvage »	Dominant
Brun	Récessif, lié au sexe
Agate	Récessif, lié au sexe
Opale	Dominant, autosomal

### Bouvreuil pivoine (*Pyrrhula pyrrhula*)

Phénotype « sauvage »	Dominant
Facteur « pastel »	Récessif, lié au sexe
Brun	Récessif, lié au sexe
Jaune	Récessif, autosomal
Blanc	Récessif, autosomal
Topaze	Récessif, autosomal

### Moineau domestique (*Passer domesticus*)

Phénotype « sauvage »	Dominant
Brun	Récessif, lié au sexe
Phaéo (Yeux rouge)	Récessif, autosomal
Agate	Récessif, lié au sexe
Opale	Récessif, autosomal
Facteur « pastel »	Récessif, lié au sexe
Ino	Récessif, lié au sexe
Blanc (Yeux noirs)	Dominant, autosomal
Satiné	Récessif, lié au sexe

### Moineau friquet (*Passer montanus*)

Phénotype « sauvage »	Dominant
Brun	Dominant, autosomal
Facteur « Opale »	Récessif, autosomal

### Merle noir (*Turdus merula*)

Phénotype « sauvage »  
Pastel  
Ino (ex Albino)  
Blanc

Dominant  
Récessif, lié au sexe  
Récessif, lié au sexe  
Récessif, autosomal

Brun  
Agate  
Phaéo  
Blanc  
Facteur « Pastel »

Récessif, lié au sexe  
Récessif, lié au sexe  
Récessif, autosomal  
Récessif, autosomal  
Récessif, lié au sexe

### Grive musicienne (Turdus philomelos)

Phénotype « sauvage »  
Brun  
Blanc  
Satiné

Dominant  
Récessif, lié au sexe  
Récessif, autosomal  
Récessif, lié au sexe

### Pie bavarde (Pica pica)

Phénotype « sauvage »  
Brun

Dominant  
Récessif, lié au sexe

### Etourneau sansonnet (Sturnus vulgaris)

Phénotype « sauvage »

Dominant

### Geai des chênes (Garrulus glandarius)

Phénotype « sauvage »  
Opale

Dominant  
Récessif, autosomal

- Chez la plupart des espèces de la faune européenne, d'autres mutations non reconnues officiellement par la COM/OMJ sont actuellement en étude